UNIVERSITÉ TOULOUSE III – PAUL SABATIER
FACULTÉS DE MÉDECINE

ANNÉE 2018

2018 TOU3 1577

THÈSE

POUR LE DIPLÔME D'ÉTAT DE DOCTEUR EN MÉDECINE
MÉDECINE SPÉCIALISÉE CLINIQUE

Présentée et soutenue publiquement

par

Hugo GORNES

le 17 Septembre 2018

COMPLICATIONS POST - OPERATOIRES IMMEDIATES DE LA
CHIRURGIE DE L'ENDOMETRIOSE PELVIENNE PROFONDE AVEC
ATTEINTE DIGESTIVE : ETUDE DESCRIPTIVE SUR 164 PATIENTES

Directeur de thèse : Dr Elodie CHANTALAT

JURY

Monsieur le Professeur Olivier PARANT

Président

Monsieur le Professeur Bertrand SUC

Assesseur

Monsieur le Docteur Jacques RIMAILHO

Assesseur

Madame le Docteur Elodie CHANTALAT

Assesseur

Monsieur le Docteur Yann TANGUY LE GAC

Suppléant

Monsieur le Professeur Pierre LEGUEVAQUE

Membre Invité

UNIVERSITÉ
TOULOUSE III
PAUL SABATIER

Université
de Toulouse

FACULTÉ DE MÉDECINE PURPAN

TABLE DES MATIERES

REMERCIEMENTS	8
INTRODUCTION	20
1. Définition	20
2. Histoire	20
3. Physiopathologie	21
a. Théorie du reflux menstruel	21
b. Théorie des métaplasies	22
c. Autres théories.....	22
4. Épidémiologie	23
5. Clinique	24
6. Examens complémentaires	26
7. Classifications	29
8. Facteurs de risque	34
a. Histoire menstruelle.....	34
b. Parité.....	34
c. Allaitement.....	34
d. Poids	34
e. Sexe	34
f. Classe socio-économique	34
g. Tabac – Sport	35
h. Contraception orale hormonale	35
i. Facteur familial	35
j. Autres facteurs de risque.....	35
9. Transformation maligne	36
10. Traitement	36
a. Médical	36
b. Chirurgical	37
Problématique	40
Objectif	40
MATERIELS ET METHODES	41
Sélection des patientes, critères d'inclusion et d'exclusion	41
Données cliniques	41
Modalités diagnostiques et thérapeutiques	42

Modalités de suivi	43
Analyse statistique	44
RESULTATS	45
Caractéristiques des patientes (Tableau 1).....	45
Caractéristiques de la pathologie (Tableau 3).....	48
Caractéristiques de la chirurgie	49
Caractéristiques post-opératoires.....	51
Analyse de la prise en charge chirurgicale en fonction des caractéristiques des patientes et de la maladie.....	54
Analyse des complications en fonction de la prise en charge chirurgicale (Tableau 11).....	56
Analyse univariée.....	57
Analyse multivariée	60
DISCUSSION	61
Facteurs pourvoyeurs de complications en fonction de la population	61
Facteurs pourvoyeurs de complications liés à l'atteinte endométriosique	62
Facteurs pourvoyeurs de complications en fonction de la chirurgie.....	63
La résection rectale segmentaire	63
Ouverture vaginale	65
Réalisation d'une dérivation digestive.....	66
Autres facteurs.....	68
Chirurgie radicale ou conservatrice ?	71
Réunion de Concertation Pluridisciplinaire (RCP) dédiée à l'endométriose.....	72
Apports et limites de notre étude.....	73
Chirurgie de l'endométriose profonde et qualité de vie	73
CONCLUSION	75
BIBLIOGRAPHIE	76
RESUME EN ANGLAIS	83
RESUME EN FRANCAIS	84

TABLEAU du PERSONNEL HU
des Facultés de Médecine de l'Université Paul Sabatier
au 1^{er} septembre 2017

Professeurs Honoraires

Doyen Honoraire	M. ROUGE Daniel	Professeur Honoraire	M. VIRENQUE Christian
Doyen Honoraire	M. LAZORTHES Yves	Professeur Honoraire	M. CARLES Pierre
Doyen Honoraire	M. CHAP Hugues	Professeur Honoraire	M. BONAFÉ Jean-Louis
Doyen Honoraire	M. GUIRAUD-CHAUMEIL Bernard	Professeur Honoraire	M. VAYSSÉ Philippe
Doyen Honoraire	M. PUEL Pierre	Professeur Honoraire	M. ESCUERRE J.P.
Professeur Honoraire	M. ESCHAPASSE Henri	Professeur Honoraire	M. GUITARD Jacques
Professeur Honoraire	M. GEDEON André	Professeur Honoraire	M. LAZORTHES Franck
Professeur Honoraire	M. PASQUIE M.	Professeur Honoraire	M. ROQUE-LATRILLE Christian
Professeur Honoraire	M. RIBAUT Louis	Professeur Honoraire	M. CERENE Alain
Professeur Honoraire	M. ARLET Jacques	Professeur Honoraire	M. FOURNIAL Gérard
Professeur Honoraire	M. RIBET André	Professeur Honoraire	M. HOFF Jean
Professeur Honoraire	M. MONROZIES M.	Professeur Honoraire	M. REME Jean-Michel
Professeur Honoraire	M. DALOUS Antoine	Professeur Honoraire	M. FAUVEL Jean-Marie
Professeur Honoraire	M. DUPRE M.	Professeur Honoraire	M. FRESINOS Jacques
Professeur Honoraire	M. FABRE Jean	Professeur Honoraire	M. CARRIERE Jean-Paul
Professeur Honoraire	M. DUCOS Jean	Professeur Honoraire	M. MANSAT Michel
Professeur Honoraire	M. LACOMME Yves	Professeur Honoraire	M. BARRET André
Professeur Honoraire	M. COTONAT Jean	Professeur Honoraire	M. ROLLAND
Professeur Honoraire	M. DAVID Jean-Frédéric	Professeur Honoraire	M. THOUVENOT Jean-Paul
Professeur Honoraire	Mme DIDIER Jacqueline	Professeur Honoraire	M. CAHUZAC Jean-Philippe
Professeur Honoraire	Mme LARENG Marie-Blanche	Professeur Honoraire	M. DELSOL Georges
Professeur Honoraire	M. BERNADET	Professeur Honoraire	M. ABBAL Michel
Professeur Honoraire	M. REGNIER Claude	Professeur Honoraire	M. DURAND Dominique
Professeur Honoraire	M. COMBELLES	Professeur Honoraire	M. DALY-SCHWEITZER Nicolas
Professeur Honoraire	M. REGIS Henri	Professeur Honoraire	M. RAILHAC
Professeur Honoraire	M. ARBUS Louis	Professeur Honoraire	M. POURRAT Jacques
Professeur Honoraire	M. PUJOL Michel	Professeur Honoraire	M. QUERLEU Denis
Professeur Honoraire	M. ROCHICCIOLI Pierre	Professeur Honoraire	M. ARNE Jean-Louis
Professeur Honoraire	M. RUMEAU Jean-Louis	Professeur Honoraire	M. ESCOURROU Jean
Professeur Honoraire	M. BESOMBES Jean-Paul	Professeur Honoraire	M. FORTANIER Gilles
Professeur Honoraire	M. SUC Jean-Michel	Professeur Honoraire	M. LAGARRIGUE Jacques
Professeur Honoraire	M. VALDIGUIE Pierre	Professeur Honoraire	M. PESSEY Jean-Jacques
Professeur Honoraire	M. BOUNHOURE Jean-Paul	Professeur Honoraire	M. CHAVOIN Jean-Pierre
Professeur Honoraire	M. CARTON Michel	Professeur Honoraire	M. GERAUD Gilles
Professeur Honoraire	Mme PUEL Jacqueline	Professeur Honoraire	M. PLANTE Pierre
Professeur Honoraire	M. GOUZI Jean-Louis	Professeur Honoraire	M. MAGNAVAL Jean-François
Professeur Honoraire associé	M. DUTAU Guy	Professeur Honoraire	M. MONROZIES Xavier
Professeur Honoraire	M. PASCAL J.P.	Professeur Honoraire	M. MOSCOVICI Jacques
Professeur Honoraire	M. SALVADOR Michel	Professeur Honoraire	Mme GENESTAL Michèle
Professeur Honoraire	M. BAYARD Francis	Professeur Honoraire	M. CHAMONTIN Bernard
Professeur Honoraire	M. LEOPHONTE Paul	Professeur Honoraire	M. SALVAYRE Robert
Professeur Honoraire	M. FABIE Michel	Professeur Honoraire	M. FRAYSSE Bernard
Professeur Honoraire	M. BARTHE Philippe	Professeur Honoraire	M. BUGAT Roland
Professeur Honoraire	M. CABARROT Etienne	Professeur Honoraire	M. PRADERE Bernard
Professeur Honoraire	M. DUFFAUT Michel	Professeur Honoraire	M. CHAP Hugues
Professeur Honoraire	M. ESCANDE Michel	Professeur Honoraire	M. LAURENT Guy
Professeur Honoraire	M. PRIS Jacques	Professeur Honoraire	M. ARLET Philippe
Professeur Honoraire	M. CATHALA Bernard	Professeur Honoraire	Mme MARTY Nicole
Professeur Honoraire	M. BAZEX Jacques	Professeur Honoraire	M. MASSIP Patrice
		Professeur Honoraire	M. CLANET Michel

Professeurs Émérites

Professeur ALBAREDE Jean-Louis	Professeur MAZIERES Bernard
Professeur CONTÉ Jean	Professeur ARLET-SUAU Elisabeth
Professeur MURAT	Professeur SIMON Jacques
Professeur MANELFE Claude	Professeur FRAYSSE Bernard
Professeur LOUVET P.	Professeur ARBUS Louis
Professeur SARRAMON Jean-Pierre	Professeur CHAMONTIN Bernard
Professeur CARATERO Claude	Professeur SALVAYRE Robert
Professeur GUIRAUD-CHAUMEIL Bernard	Professeur MAGNAVAL Jean-François
Professeur COSTAGLIOLA Michel	Professeur ROQUES-LATRILLE Christian
Professeur ADER Jean-Louis	Professeur MOSCOVICI Jacques
Professeur LAZORTHES Yves	Professeur LAGARRIGUE Jacques
Professeur LARENG Louis	Professeur CHAP Hugues
Professeur JOFFRE Francis	Professeur LAURENT Guy
Professeur BONEU Bernard	Professeur MASSIP Patrice
Professeur DABERNAT Henri	
Professeur BOCCALON Henri	

FACULTE DE MEDECINE TOULOUSE-PURPAN

37 allées Jules Guesde - 31062 TOULOUSE Cedex

Doyen : D. CARRIE

P.U. - P.H. Classe Exceptionnelle et 1ère classe		P.U. - P.H. 2ème classe	
M. ADOUE Daniel (C.E)	Médecine Interne, Gériatrie	Mme BONGARD Vanina	Epidémiologie
M. AMAR Jacques	Thérapeutique	M. BONNEVILLE Nicolas	Chirurgie orthopédique et traumatologique
M. ATTAL Michel (C.E)	Hématologie	M. BUREAU Christophe	Hépatogastro-entéro
M. AVET-LOISEAU Hervé	Hématologie, transfusion	M. CALVAS Patrick	Génétique
Mme BEYNE-RAUZY Odile	Médecine Interne	M. CARRERE Nicolas	Chirurgie Générale
M. BIRMES Philippe	Psychiatrie	Mme CASPER Charlotte	Pédiatrie
M. BLANCHER Antoine	Immunologie (option Biologique)	M. CHAIX Yves	Pédiatrie
M. BONNEVILLE Paul	Chirurgie Orthopédique et Traumatologie.	Mme CHARPENTIER Sandrine	Thérapeutique, méd. d'urgence, addict
M. BOSSAVY Jean-Pierre	Chirurgie Vasculaire	M. COGNARD Christophe	Neuroradiologie
M. BRASSAT David	Neurologie	M. FOURNIE Bernard	Rhumatologie
M. BROUCHE Laurent	Chirurgie thoracique et cardio-vascul	M. FOURNIÉ Pierre	Ophthalmologie
M. BROUSSET Pierre (C.E)	Anatomie pathologique	M. GAME Xavier	Urologie
M. CARRIE Didier (C.E)	Cardiologie	M. LAROCHE Michel	Rhumatologie
M. CHAUVEAU Dominique	Néphrologie	M. LEOBON Bertrand	Chirurgie Thoracique et Cardiaque
M. CHOLLET François (C.E)	Neurologie	M. LOPEZ Raphael	Anatomie
M. DAHAN Marcel (C.E)	Chirurgie Thoracique et Cardiaque	M. MARX Mathieu	Oto-rhino-laryngologie
M. DE BOISSEZON Xavier	Médecine Physique et Réadapt Fonct.	M. MAS Emmanuel	Pédiatrie
M. DEGUINE Olivier	Oto-rhino-laryngologie	M. OLIVOT Jean-Marc	Neurologie
M. DUCOMMUN Bernard	Cancérologie	M. PARANT Olivier	Gynécologie Obstétrique
M. FERRIERES Jean	Epidémiologie, Santé Publique	M. PAYRASTRE Bernard	Hématologie
M. FOURCADE Olivier	Anesthésiologie	M. PERON Jean-Marie	Hépatogastro-entérologie
M. GEERAERTS Thomas	Anesthésiologie et réanimation	M. PORTIER Guillaume	Chirurgie Digestive
M. IZOPET Jacques (C.E)	Bactériologie-Virologie	M. RONCALLI Jérôme	Cardiologie
Mme LAMANT Laurence	Anatomie Pathologique	Mme SAVAGNER Frédérique	Biochimie et biologie moléculaire
M. LANG Thierry (C.E)	Biostatistiques et Informatique Médicale	M. SOL Jean-Christophe	Neurochirurgie
M. LANGIN Dominique	Nutrition		
M. LAUQUE Dominique (C.E)	Médecine Interne		
M. LAUWERS Frédéric	Anatomie		
M. LIBLAU Roland (C.E)	Immunologie		
M. MALAVAUD Bernard	Urologie		
M. MANSAT Pierre	Chirurgie Orthopédique		
M. MARCHOU Bruno (C.E)	Maladies Infectieuses		
M. MAZIERES Julien	Pneumologie		
M. MOLINIER Laurent	Epidémiologie, Santé Publique		
M. MONTASTRUC Jean-Louis (C.E)	Pharmacologie		
Mme MOYAL Elisabeth	Cancérologie		
Mme NOURHASHEMI Fatemeh (C.E)	Gériatrie		
M. OLIVES Jean-Pierre (C.E)	Pédiatrie		
M. OSWALD Eric	Bactériologie-Virologie		
M. PARIENTE Jérémie	Neurologie		
M. PARINAUD Jean (C.E)	Biol. Du Dévelop. et de la Reprod.		
M. PAUL Carle	Dermatologie		
M. PAYOUX Pierre	Biophysique		
M. PERRET Bertrand (C.E)	Biochimie		
M. RASCOL Olivier (C.E)	Pharmacologie		
M. RECHER Christian	Hématologie		
M. RISCHMANN Pascal	Urologie		
M. RIVIERE Daniel (C.E)	Physiologie		
M. SALES DE GAUZY Jérôme	Chirurgie Infantile		
M. SALLES Jean-Pierre	Pédiatrie		
M. SANS Nicolas	Radiologie		
Mme SELVES Janick	Anatomie et cytologie pathologiques		
M. SERRE Guy (C.E)	Biologie Cellulaire		
M. TELMON Norbert	Médecine Légale		
M. VINEL Jean-Pierre (C.E)	Hépatogastro-entérologie		
P.U. Médecine générale		P.U. Médecine générale	
M. OUSTRIC Stéphane	Médecine Générale	M. MESTHÉ Pierre	Médecine Générale
		P.A Médecine générale	
		POUTRAIN Jean-Christophe	Médecine Générale

FACULTE DE MEDECINE TOULOUSE-RANGUEIL

133, route de Narbonne - 31062 TOULOUSE Cedex

Doyen : E. SERRANO

P.U. - P.H. Classe Exceptionnelle et 1ère classe		P.U. - P.H. 2ème classe	
M. ACAR Philippe	Pédiatrie	M. ACCADBLE Franck	Chirurgie Infantile
M. ALRIC Laurent	Médecine Interne	M. ARBUS Christophe	Psychiatrie
Mme ANDRIEU Sandrine	Epidémiologie	M. BERRY Antoine	Parasitologie
M. ARNAL Jean-François	Physiologie	M. BONNEVILLE Fabrice	Radiologie
Mme BERRY Isabelle (C.E)	Biophysique	M. BOUNES Vincent	Médecine d'urgence
M. BOUTAULT Franck (C.E)	Chirurgie Maxillo-Faciale et Stomatologie	Mme BOURNET Barbara	Gastro-entérologie
M. BUJAN Louis (C. E)	Urologie-Andrologie	M. CHAUFOUR Xavier	Chirurgie Vasculaire
Mme BURRA-RIVIERE Alessandra	Médecine Vasculaire	M. CHAYNES Patrick	Anatomie
M. BUSCAIL Louis (C.E)	Hépatogastro-Entérologie	Mme DALENC Florence	Cancérologie
M. CANTAGREL Alain (C.E)	Rhumatologie	M. DECRAMER Stéphane	Pédiatrie
M. CARON Philippe (C.E)	Endocrinologie	M. DELOBEL Pierre	Maladies Infectieuses
M. CHIRON Philippe (C.E)	Chirurgie Orthopédique et Traumatologie	M. FRANCHITTO Nicolas	Addictologie
M. CONSTANTIN Arnaud	Rhumatologie	M. GARRIDO-STÓWHAS Ignacio	Chirurgie Plastique
M. COURBON Frédéric	Biophysique	Mme GOMEZ-BROUCHET Anne-Muriel	Anatomie Pathologique
Mme COURTADE SAIDI Monique	Histologie Embryologie	M. HUYGHE Eric	Urologie
M. DAMBRIN Camille	Chirurgie Thoracique et Cardiovasculaire	Mme LAPRIE Anne	Radiothérapie
M. DELABESSE Eric	Hématologie	M. MARCHEIX Bertrand	Chirurgie thoracique et cardiovasculaire
Mme DELISLE Marie-Bernadette (C.E)	Anatomie Pathologie	M. MAURY Jean-Philippe	Cardiologie
M. DELORD Jean-Pierre	Cancérologie	M. MEYER Nicolas	Dermatologie
M. DIDIER Alain (C.E)	Pneumologie	M. MUSCARI Fabrice	Chirurgie Digestive
Mme DULY-BOUHANICK Béatrice	Thérapeutique	M. OTAL Philippe	Radiologie
M. ELBAZ Meyer	Cardiologie	M. SOLER Vincent	Ophthalmologie
M. GALINIER Michel	Cardiologie	Mme SOTO-MARTIN Maria-Eugénia	Gériatrie et biologie du vieillissement
M. GALINIER Philippe	Chirurgie Infantile	M. TACK Ivan	Physiologie
M. GLOCK Yves (C.E)	Chirurgie Cardio-Vasculaire	M. VERGEZ Sébastien	Oto-rhino-laryngologie
M. GOURDY Pierre	Endocrinologie	M. YSEBAERT Loic	Hématologie
M. GRAND Alain (C.E)	Epidémiologie. Eco. de la Santé et Prévention		
M. GROLEAU RAOUX Jean-Louis	Chirurgie plastique	P.U. Médecine générale	
Mme GUIMBAUD Rosine	Cancérologie	Mme ROUGE-BUGAT Marie-Eve	Médecine Générale
Mme HANAIRE Héléne (C.E)	Endocrinologie		
M. KAMAR Nassim	Néphrologie		
M. LARRUE Vincent	Neurologie		
M. LEVADE Thierry (C.E)	Biochimie		
M. MALECAZE François (C.E)	Ophthalmologie		
M. MARQUE Philippe	Médecine Physique et Réadaptation		
Mme MAZEREEUW Juliette	Dermatologie		
M. MINVILLE Vincent	Anesthésiologie Réanimation		
M. RAYNAUD Jean-Philippe (C.E)	Psychiatrie Infantile		
M. RITZ Patrick	Nutrition		
M. ROCHE Henri (C.E)	Cancérologie		
M. ROLLAND Yves (C.E)	Gériatrie		
M. ROUGE Daniel (C.E)	Médecine Légale		
M. ROUSSEAU Hervé (C.E)	Radiologie		
M. ROUX Franck-Emmanuel	Neurochirurgie		
M. SAILLER Laurent	Médecine Interne		
M. SCHMITT Laurent (C.E)	Psychiatrie		
M. SENARD Jean-Michel (C.E)	Pharmacologie		
M. SERRANO Elie (C.E)	Oto-rhino-laryngologie		
M. SOULAT Jean-Marc	Médecine du Travail		
M. SOULIE Michel (C.E)	Urologie		
M. SUC Bertrand	Chirurgie Digestive		
Mme TAUBER Marie-Thérèse (C.E)	Pédiatrie		
Mme URO-COSTE Emmanuelle	Anatomie Pathologique		
M. VAYSSIERE Christophe	Gynécologie Obstétrique		
M. VELLAS Bruno (C.E)	Gériatrie		

Professeur Associé de Médecine Générale
Pr STILLMUNKES André

Professeur Associé en O.R.L.
Pr WOISARD Virginie

M.C.U. - P.H.

M. ABBO Olivier	Chirurgie infantile
M. APOIL Pol Andre	Immunologie
Mme ARNAUD Catherine	Epidémiologie
M. BIETH Eric	Génétique
Mme CASPAR BAUGUIL Sylvie	Nutrition
Mme CASSAING Sophie	Parasitologie
M. CAVAINAC Etienne	Chirurgie orthopédique et traumatologie
M. CONGY Nicolas	Immunologie
Mme COURBON Christine	Pharmacologie
Mme DAMASE Christine	Pharmacologie
Mme de GLISEZENSKY Isabelle	Physiologie
Mme DE MAS Véronique	Hématologie
Mme DELMAS Catherine	Bactériologie Virologie Hygiène
M. DUBOIS Damien	Bactériologie Virologie Hygiène
M. DUPUI Philippe	Physiologie
M. FAGUER Stanislas	Néphrologie
Mme FILLAUX Judith	Parasitologie
M. GANTET Pierre	Biophysique
Mme GENNERO Isabelle	Biochimie
Mme GENOUX Annelise	Biochimie et biologie moléculaire
M. HAMDJ Safouane	Biochimie
Mme HITZEL Anne	Biophysique
M. IRIART Xavier	Parasitologie et mycologie
Mme JONCA Nathalie	Biologie cellulaire
M. KIRZIN Sylvain	Chirurgie générale
Mme LAPEYRE-MESTRE Maryse	Pharmacologie
M. LAURENT Camille	Anatomie Pathologique
M. LHERMUSIER Thibault	Cardiologie
M. LHOMME Sébastien	Bactériologie-virologie
Mme MONTASTIER Emilie	Nutrition
Mme MOREAU Marion	Physiologie
Mme NOGUEIRA M.L.	Biologie Cellulaire
M. PILLARD Fabien	Physiologie
Mme PUISSANT Bénédicte	Immunologie
Mme RAYMOND Stéphanie	Bactériologie Virologie Hygiène
Mme SABOURDY Frédéric	Biochimie
Mme SAUNE Karine	Bactériologie Virologie
M. SILVA SIFONTES Stein	Réanimation
M. TAFANI Jean-André	Biophysique
M. TREINER Emmanuel	Immunologie
Mme TREMOLLIERES Florence	Biologie du développement
Mme VAYSSE Charlotte	Cancérologie
M. VIDAL Fabien	Gynécologie obstétrique

M.C.U. Médecine générale

M. BRILLAC Thierry
Mme DUPOUY Julie

M.C.U. - P.H

Mme ABRAVANEL Florence	Bactériologie Virologie Hygiène
Mme BASSET Céline	Cytologie et histologie
Mme CAMARE Caroline	Biochimie et biologie moléculaire
M. CAMBUS Jean-Pierre	Hématologie
Mme CANTERO Anne-Valérie	Biochimie
Mme CARFAGNA Luana	Pédiatrie
Mme CASSOL Emmanuelle	Biophysique
Mme CAUSSE Elizabeth	Biochimie
M. CHAPUT Benoit	Chirurgie plastique et des brûlés
M. CHASSAING Nicolas	Génétique
M. CLAVEL Cyril	Biologie Cellulaire
Mme COLLIN Laetitia	Cytologie
Mme COLOMBAT Magali	Anatomie et cytologie pathologiques
M. CORRE Jill	Hématologie
M. DE BONNECAZE Guillaume	Anatomie
M. DEDOUIT Fabrice	Médecine Légale
M. DELPLA Pierre-André	Médecine Légale
M. DESPAS Fabien	Pharmacologie
M. EDOUARD Thomas	Pédiatrie
Mme ESQUIROL Yolande	Médecine du travail
Mme EVRARD Solène	Histologie, embryologie et cytologie
Mme GALINIER Anne	Nutrition
Mme GARDETTE Virginie	Epidémiologie
M. GASQ David	Physiologie
Mme GRARE Marion	Bactériologie Virologie Hygiène
Mme GUILBEAU-FRUGIER Céline	Anatomie Pathologique
M. GUILLEMINAULT Laurent	Pneumologie
Mme GUYONNET Sophie	Nutrition
M. HERIN Fabrice	Médecine et santé au travail
Mme INGUENEAU Cécile	Biochimie
M. LAIREZ Olivier	Biophysique et médecine nucléaire
M. LEANDRI Roger	Biologie du dével. et de la reproduction
M. LEPAGE Benoit	Biostatistiques et Informatique médicale
Mme MAUPAS Françoise	Biochimie
M. MIEUSSET Roger	Biologie du dével. et de la reproduction
Mme NASR Nathalie	Neurologie
Mme PRADDAUDE Françoise	Physiologie
M. RIMAILHO Jacques	Anatomie et Chirurgie Générale
M. RONGIERES Michel	Anatomie - Chirurgie orthopédique
Mme SOMMET Agnès	Pharmacologie
Mme VALLET Marion	Physiologie
M. VERGEZ François	Hématologie
Mme VEZZOSI Delphine	Endocrinologie

M.C.U. Médecine générale

M. BISMUTH Michel
Mme ESCOURROU Brigitte

Maîtres de Conférences Associés de Médecine Générale

Dr ABITTEBOUL Yves
Dr CHICOULAA Bruno
Dr IRI-DELAHAYE Motoko
Dr FREYENS Anne

Dr BOYER Pierre
Dr ANE Serge
Dr BIREBENT Jordan
Dr LATROUS Leila

REMERCIEMENTS

"Le plus dur dans une thèse ça n'est pas la thèse, ce sont les remerciements."

Monsieur le Professeur Olivier PARANT
Professeur des Universités
Praticien Hospitalier
Gynécologie Obstétrique

Vous me faites le grand honneur de présider le jury de ma thèse et de juger ce travail.
Votre humanité, vos enseignements, votre passion et vos spatules à deux doigts font de
vous un modèle pour les internes.

J'ai beaucoup appris à vos côtés notamment durant nos gardes à 7 césariennes, votre
nomogramme sur la salpingectomie pour la GEU, nos courses en scooter...
Veuillez trouver ici l'expression de mes sincères remerciements et de mon profond respect.

Monsieur le Professeur Bertrand SUC
Professeur des Universités
Praticien Hospitalier
Chirurgie Générale et Digestive

Vous me faites l'honneur de siéger dans ce jury.
Votre dévouement auprès des malades et votre dynamisme au bloc opératoire m'ont dirigé
vers la chirurgie après un stage d'externat dans votre service.
Veuillez trouver ici l'expression de mon profond respect.

Monsieur le Docteur Jacques RIMAILHO
Maître de Conférence des Universités
Praticien Hospitalier
Chirurgie Générale et Gynécologique

Vous me faites l'honneur de juger ce travail.

Je vous remercie pour votre enseignement, votre patience, votre humour et vos précieux conseils. Vous m'avez été d'une grande aide tout au long de mon internat.

Entre Rosas, la colposcopie et la taumachie nos discussions per-opératoires furent souvent animées.

Veillez trouver ici le témoignage de ma sincère gratitude.

Madame le Docteur Elodie CHANTALAT
Maître de Conférence des Universités
Praticien Hospitalier
Chirurgie Générale et Gynécologique

Tu me fais l'immense joie de diriger ma thèse.

Tu as été un modèle pendant tout mon internat. Ton dévouement, ta sincérité, ton engagement auprès des patientes est un exemple pour nous tous ("je vous donne mon numéro de portable ?"). Même si j'ai dû subir quelques "Emma-Pouce" ou "Louisette-à-Paillettes", je te remercie pour tout ce que tu as fait pour moi, tout ce que tu m'as enseigné, toute ta patience à mon égard (heureusement que les hypoglycémies de fin de matinée étaient là).

Tu es aussi à l'origine des #tolérance et #susceptibilité qui me suivent depuis maintenant 3 ans. Comment ne pas parler des sandwiches au thon que je t'ai regardé manger tout au long de mon internat, sache que les relais H de Ranguel et de l'Oncopole s'associent à mes remerciements, leurs chiffres d'affaires ayant doublé pour chacune de tes grossesses. Je te remercie enfin pour ce travail qui nous tenait à cœur, tu as été une directrice de thèse formidable ("c'est très bien Hugo, mais on va quand même tout changer d'ici demain" mais aussi "maintenant que tu m'en as parlé, il faut que tu le rajoutes" alors que la thèse était déjà imprimée ou encore "voilà Hugo, ce paragraphe est parfait, il introduit très bien la suite" ... "oui Elo, c'est normal, c'est toi qui l'a écrit").

Plus sérieusement, cette thèse n'aurait jamais vu le jour sans toi.

En espérant continuer à travailler un peu avec toi.

Sois assurée de mes sincères remerciements.

Monsieur le Docteur Yann TANGUY LE GAC
Praticien Hospitalier
Chirurgie Gynécologique – Obstétrique

Tu as accepté de juger ce travail et je t'en remercie.
Ta rigueur, ta bonne humeur, tes conseils font que nous nous battons pour travailler avec
toi. Ton artère temporale saillante fait partie des monuments incontournables de PDV.
C'est un honneur d'avoir travaillé et appris avec toi, et un plaisir de voir que tu continues de
me parler alors que je roule en BMW.

Merci pour tout Yann.

Trouve ici le témoignage de ma profonde reconnaissance.

Monsieur le Professeur Pierre LEGUEVAQUE
Professeur des Universités
Praticien Hospitalier
Chirurgie Générale et Gynécologique

Vous me faites le plaisir de participer à mon jury de thèse.
Vous me receviez dans votre bureau dès la P2, vos conseils précieux m'ont amené vers la
chirurgie gynécologique et mon passage dans votre service a fait partie des meilleurs
stages de mon internat (avec Dame Leray, Maitre Denax et Prince Marie).
Votre connaissance de la chirurgie, votre empathie avec les patientes sont des exemples
pour les internes.

Veillez croire en l'expression de ma profonde considération.

A ma famille,

A mon frère, Simon, tu es tout pour moi. Tu es ma fierté, mon exemple. Ta gentillesse, tes conseils, ton humour (...), nos câlins, nos bagarres. Je te souhaite le meilleur avec ma petite Ana que je remercie aussi pour tout ce qu'elle t'apporte. Je vous aime.

A mes parents, je ne sais comment vous remercier pour tout ce que vous avez fait pour moi. Vous avez toujours été là, des parents formidables.

A ma mère pour son écoute, sa patience, ses valeurs, sa volonté, son amour, nos confidences, notre complicité... tu m'as tellement apporté. L'indispensable avait dit papi...

A mon père pour sa rigueur, mes premiers pas au bloc opératoire, sa présence, son accompagnement, ses appels pour me motiver de la P1 à l'internat, l'amour de ses fils. Tu as été mon modèle pendant toutes ces années.

A mes grands-parents Marty, Mamie Vévé et Papi Pierrot, j'aurais tellement aimé vous avoir avec moi ce soir, "le toubib". Vous m'avez tant donné, merci pour tout. Je vous aime.

A mes grands-parents Gornes, si je passe ma thèse aujourd'hui c'est en grande partie grâce à vous. Des sandwiches en 1^{ère} année aux diners pendant l'externat, une grande complicité entre nous, vous m'avez toujours soutenu. Je vous aime.

A mes oncles et tantes, Philippe, Jean Paul, Nicole et Nicole, Corinne.

A mes cousins et cousines, Marie, Karine, Nicolas, Pierre, Sabine, Chris, Philippe. Et à mes petits cousins Jules, Aubin, Adrien, Eliott, Mila et Victoria.

A ma famille de Limoges, les Glomot. Merci pour tout ce que vous m'avez apporté, merci d'avoir accepté que je sorte avec votre fille/sœur, merci pour ces beaux weekends dans le Limousin, merci de m'avoir fait aimer l'île de Ré. A Flavie, Steph, Xav et Toupy.

A toi Hélène,

Je ne pensais pas pouvoir aimer quelqu'un aussi intensément.

Nous passons nos thèses en 2018 mais il nous reste tellement de choses à vivre ensemble.

Reçois ici le témoignage de tout mon amour.

A mes potes de la vie,

Nicolas, pour ce que tu es, ton humour, ton charisme, tes décisions tranchées, un super pote pour la vie.

Greg, Benny, Benji, depuis la 1^{ère} S on ne se quitte plus, la distance ne nous a pas éloigné bien au contraire, même ta sous-spécialité ne m'empêche pas de t'apprécier. Et à ta femme Amandine, qui t'a donné 2 filles magnifiques, nous étions tous les 3 dans la même classe au lycée, voisins à Frouzins, et toujours aussi heureux de vos passages à Toulouse.

Arnaud, le mec des montagnes, un cœur immense, un ami en or. Rencontré en P1, on ne se quittera plus.

Jojo, absent aujourd'hui pour cause de machine à laver à récupérer à Pechbusque, un mec à part, au-dessus des autres, à l'origine de l'expression "c'est Joël", la vérité tu me manques.

PS : t'es nul à FIFA.

Maxime, drôle, insupportable, beau sur des skis, beau tout court, intelligent, réanimateur-anesthésiste, c'est un honneur de faire partie de tes amis

Clément, merci pour la fan zone de l'Euro 2016 et la Coupe du Monde 2018. Rien d'autre ! Kéké, que dire, connu depuis la maternelle, toujours aussi perché, en vadrouille, un super pote.

Et à vos copines, futures femmes : Charlotte, Virginie, Constance, Clémentine, Louise.

A mes copines de l'externat,

Pauline, ma grande copine ultra précaire, une passion commune la chirurgie, nos vacances à Biarritz, à Kémer, tu comptes beaucoup pour moi.

Zara, Isa, Steph, Sarah, Claire mes super copinettes que j'aime, on a partagé de belles années ensemble, j'espère que cela continuera...

A mes copains de l'externat, Pinto, Grafito, Paulo, Balzé, Capitaine Brierre, GDSM, Taf, Foulon, Marcus, Churet, Diego pour toutes ces soirées, ces sorties ski, ces foots, ces rencontres...

Aux potes de P1 : Dadoo, JR et les autres.

Aux artistes de la revue 2016 : Président GAS, Cécile, Camille, Virgile, Ségo, Zoé, Hub.

A mes potes de l'internat,

Loulou pour tous ces moments passés ensemble, d'astreinte une semaine sur 2 avec toi à Auch ça marque un homme, pour nos soirées, nos foots et puis un orthopédiste sympa et intelligent c'est quand même agréable.

Pierre-Marie, quelle belle rencontre. Longtemps mon ennemi, ta découverte à Ranguel pour le meilleur semestre de mon internat. Tu as beaucoup de qualité mais franchement, supporter le Stade Rennais, c'est vraiment légal ça ? Un super mec, une petite Charlotte géniale, le couple glamour de l'internat avec Florence que j'apprécie tout autant.

A ma famille de Montbel, les Mur, les Clavel, les Corrèze, les Espinasse... on a grandi ensemble dans un endroit magique et 25 ans plus tard on continue à se voir.

Aux copains de la cup. A ma Camille, mon ophtalmo préférée, un grand cœur, un rire hors du commun, très acide par moment et à Biba.

Aux copains du foot, à coach Ben, à Ju, YoPo, Peyo, Piquet, Vince, Rom, à toute l'équipe, quel plaisir de jouer avec vous et quelle fierté d'avoir été votre capitaine. SPARTIATES

A mes co-internes,

Ceux de Rodez : La crugh, Farou, Yaz, Victor, Quentin, Richou et tous les autres, un 1^{er} semestre de l'espace !

Ceux de chirurgie pédiatrique : Béa, Vadim, Mélodie (la star de la chir péd)

Ceux de Auch : Ma Pauline qui m'a tout appris que de bons moments avec toi, Loulou, Doudou, Florence, Anne-So, Meumeu, Marine et les autres

Ceux des Grossesses Pathos : Camillou, Sanson, PJ des pathos 2, Cécile

Ceux de Ranguel, mon Leray ("Pieeeeeerrrrrrreeeeee" "Ah ben dites donc") on t'a martyrisé pendant 6 mois et tu as (presque) toujours ris avec nous, PM la star de l'urologie toulousaine

Ceux de Digestif : Amal mon coup de cœur venu de Dubaï, Rado, Paul, Marino, Zalay, Philis, Maulat, Pim

Ceux de l'Oncopole 2016 : Aurianne, Carlito, Blandoche, l'enfant Drû

Ceux de Récamier : Eych again, la deud et ma féministe préférée Héloïse

Ceux de Cahors : Pauline, Douik, Picard et Elena De Neree Tot Baberich

Ceux de l'Oncopole 2018 : Camichou, Martina, Emeline, Al Ali (disoulé, Séluuuuut), Barouk, Miassa, Bousquette, Clairon

Aux uro : Mathieu, JB, Sylvain, Marine et les autres

Mais aussi à tous mes co-internes/chefs de gynéco : Paul, Poooooooool, Fanny, Macha, Clémence, Pierre, Alex, Cabrichou, Ariane, Charlotte, Marine, Louise et ceux que j'oublie.

A Benoit, co-interne puis chef, tu m'as sauvé la vie pour cette thèse que j'ai pu écrire grâce à tes stats. Tu es également un super mec, drôle, frouzinois et même pas rancunier quand je m'endors pendant tes CLA... Mes sincères remerciements.

Merci aux sages-femmes de PDV : Sage-Femme Brauge, Emilie, Léa, Clémentine, Kévin le sage-femme, Marie, Eliane, Célia, Laure, Maria, Séb et celles et ceux que j'oublie.

Merci à toutes les équipes paramédicales infirmières, cadres et aides-soignantes : au bloc, dans les services, en consultation (à l'IUC, Rangueil, PDV, HE : Gouazé !!, à Auch : Chacha, Rodez, Cahors...).

A tous mes chefs qui m'ont tant appris :

Mr Berthod à Rodez, l'urologie version Aveyron.

En chirurgie pédiatrique : chef Bouali pour tout ce que tu m'as appris, pour tes tampons quand j'étais externe, pour tous tes bons côtés aussi, ta rigueur, nos fous rires ; ce bon Abbo la gentillesse incarnée dans un corps si atypique, je te souhaite le meilleur pour ta carrière potto ! Mr Galinier, vous qui donnez l'envie aux internes de faire de la chirurgie parce qu'avec vous la chirurgie ça n'est pas qu'utile, c'est aussi beau.

A Auch : à Mme Lejeune, à Céline, à Virginie pour m'avoir fait découvrir la gynécologie. A Thierry Asensio, notre maître à tous, un grand monsieur "Thierry est là", "Oh Hugo, regarde, j'imité les éléphants du Masai Mara".

En grossesses pathos : à Olivier, à Caro pour ta confiance, ton enseignement, ton rire ; à Marie pour ces bons moments, à Anita pour nos fous rires pendant la visite et nos imitations de PJ, à Micka, à Béa, Laure.

A Ranguel : à Mme Motton qui m'a connu en train de jouer avec mes Léo dans ma chambre et qui m'a suivi tout au long de mes études, à Marco, peu doué pour le baby-foot mais quel plaisir de travailler avec toi, à Ludi ma super-chef de clinique qui me forçait à scanner toutes les patientes du service, même les conisations.

En digestif : à Eric Bloom qui m'a montré comment faire une DPC en autant de temps que l'appendicite coelio de la salle 2, grand personnage, un honneur d'avoir pu opérer avec toi. A Mr Julio, à Sylvain pour les patientes que j'ai pu inclure grâce à toi et pour la "smart surgery", à Abdullah, à Damien, à Mr Carrères, à Mr Portier, à Pierrick. A Laurent, pour tes démos de CHIP, tes départs biarrots et parce qu'on se marre bien avec toi.

A l'Oncopole : à maître Gwen^{chirurgicale} (je sais que tu détestes que je t'appelle comme ça), tu m'as tellement appris, merci pour tout. A toute l'équipe de chirurgie : Eva, Alex, Youstine, Voglito ("tu fais le malin Gornes, mais on verra quand tu seras chef"), Gabrielle, Tiphaine et à Charlotte qui arrive à me faire bosser et m'a supporté comme externe puis interne.

A Récamier : A maitresse Gégé pour ses coups de fouet, ses hystérectomies "masterclass", ses patients LGBT + cisgenre. A Martin, "c'est qui ce Gorne", ne m'en veux pas pour les petits ponts que je t'ai mis, je t'en supplie. A Fabien, maitre hémostasien, "et oui mon poulet", avec qui j'ai tellement ris pendant 6 mois.

A Cahors, à Mr Léonard pour tout ce qu'il m'a appris même si je reste persuadé que je suis meilleur que lui au foot. A Mr Ressigeac, votre passion pour l'obstétrique est sans fin, votre gentillesse, votre humanité, votre sourire après avoir passé la nuit en salle d'accouchement.

Aux chefs de PDV croisés en garde, au staff, aux urgences, au quotidien... : Agnès, Marion, Edith, Mr Vayssière, Mr Monroziès, Christelle, Claire, Juliette.

Aux anesths d'ailleurs, que j'ai pu croiser entre 2 cafés : Dame Castel, Mme Bayoumeu, Marie², Marion à PDV. Amel et Sophie les stars de l'oncopole, mais aussi Mr Isard, Mr Pouymayou, Charlotte, Claire. Stéphanie, Mylène et Caro en digestif.

Merci à tous.

INTRODUCTION

1. Définition

L'endométriose est définie par la présence ectopique de tissu endométrial comportant des glandes épithéliales et du stroma¹. Il s'agit d'une définition purement histologique^{2,3} qui ne présage en rien de son caractère pathologique ou symptomatique. Il en existe 3 formes classées selon leur localisation : ovarienne kystique (endométriome), péritonéale superficielle et sous-péritonéale profonde. L'endométriose pelvienne profonde est définie comme une lésion d'endométriose pénétrant dans l'espace rétro-péritonéal ou dans la paroi des organes pelviens à une profondeur d'au moins 5mm⁴.

L'adénomyose représente une quatrième forme d'endométriose et correspond à la présence de cellules glandulaires endométriales au sein du muscle utérin.

2. Histoire

L'endométriose, plus de 200 ans de recherche....

Selon le savant VJ Knapp⁵, le premier auteur qui a décrit l'endométriose ovarienne serait Tailford⁶ en 1765. Dès 1779, la douleur a été identifiée comme étant le principal symptôme de la maladie par Hoctin⁷.

Néanmoins, la première définition histologique date de 1860 et avait été faite par le Dr Carl von Rokitansky^{8,9} (anatomopathologiste allemand) qui décrivait lors d'autopsies, la présence de glandes de l'endomètre dans différents organes mais également dans le myomètre. Il avait nommé cette dernière localisation : adénomyome ou cystosarcome adénoïde utérin.

En 1925, Frankl¹⁰ renomma l'invasion muqueuse du myomètre : « l'adénomyose utérine ». La première localisation endométriosique au niveau de la cloison recto-vaginale a été décrite par Cullen en 1896¹¹.

Ce n'est qu'en 1921, que le Dr John Albertson Sampson¹² a décrit l'endométriose comme étant

"la présence ectopique de tissu endométrial, ayant une structure histologique et fonctionnelle semblable à celles de la muqueuse utérine".

3. *Physiopathologie*

L'endométriose est une maladie oestrogéno-dépendante, notamment lors de sa phase chronique¹³.

La phase d'initiation est moins connue et deux grandes théories s'opposent pour expliquer sa physiopathologie : la théorie du reflux menstruel et la théorie des métaplasies.

a. Théorie du reflux menstruel

Elle a donc été évoquée pour la première fois en 1921 par Sampson¹² lors d'une communication orale au congrès de l'American Gynaecological Society « *Peritoneal endometriosis due to menstrual dissemination of endometrial tissue into the peritoneal cavity* ». Au cours de ces travaux de recherche, le Dr Sampson, gynécologue a mis en évidence la présence de tissu endométrial dans le conduit tubaire après salpingectomie et a souligné sa localisation préférentielle dans le pelvis évoquant alors la théorie des menstruations rétrogrades comme origine probable. Ce reflux rétrograde a depuis été prouvé par une étude de Halme¹⁴ en 1984 qui a montré que 90% des patientes saines présentent des traces de sang dans le péritoine en période péri-menstruelle. Egalement, l'apparition de cellules endométriales dans le liquide de dialysat péritonéal¹⁵ chez les femmes en dialyse péritonéale, appuie cette hypothèse.

Plus récemment, cette théorie fut étayée par la distribution anatomique des lésions qui prédominent dans les zones déclives au niveau de l'hémi-pelvis gauche¹⁶. Ces atteintes seraient dues à la gravité qui entrainerait une stagnation des cellules endométriales dans le pelvis avec une prédominance à gauche du fait de la présence du colon sigmoïde en fosse iliaque gauche qui diminue le flux péritonéal et menstruel reflué de ce côté-là.

Les cellules ayant reflué disséminent alors dans la cavité péritonéale et se fixent dans le péritoine au cours de la "phase d'initiation" de la maladie suivant 3 phases :

- Tout d'abord une phase de survie cellulaire qui est favorisée par une diminution des phénomènes d'apoptose par augmentation de l'expression endométriale du gène anti-apoptotique Bcl-2¹⁷.
- Ces fragments d'endomètre adhèrent ensuite à la paroi péritonéale. Or un péritoine normal agit comme une barrière protectrice contre l'adhésion du tissu endométrial

reflué. Il y a de plus en plus de preuves montrant un rôle important de la réponse immunitaire du péritoine¹⁸ dans le développement des lésions endométriales. En effet, il a été montré que plusieurs molécules d'adhésion exprimées par des cellules mésothéliales à la surface du péritoine telles que les intégrines, les cadhérines, le VCAM-I et l'ICAM-I, facilitent la fixation des cellules endométriales¹⁹⁻²¹.

L'endométriose péritonéale a été minutieusement étudiée, bien que la plupart des recherches ait jusqu'ici porté sur les caractéristiques du tissu endométrial, au lieu des caractéristiques péritonéales et des adaptations cellulaires.

- La dernière phase consiste en une invasion du péritoine par les cellules endométriales. Cette invasion est favorisée par une surexpression de métalloprotéases qui vont dégrader des composants de la matrice extracellulaire du péritoine. Ces métalloprotéases sont normalement inhibées en phase lutéale sous l'influence de la progestérone. Or, les patientes endométriosiques présentent une résistance à la progestérone à l'origine d'une dérégulation de ces métalloprotéases (MMP-3, MMP-7, MMP-11)²².

Cette phase d'initiation reste peu connue, mais il semblerait que des perturbations du système immunitaire seraient à l'origine, de façon couplée à l'oestrogéno-dépendance, de l'implantation et de la progression des lésions d'endométriose²³.

b. Théorie des métaplasies

La métaplasie est le processus de transformation d'un tissu différencié en un autre tissu différencié. Le concept de métaplasie cœlomique consiste en une transformation de l'épithélium péritonéal en tissu endométrial. L'origine embryologique du péritoine pelvien étant la même que les canaux müllériens et que l'épithélium germinal ovarien, le péritoine pourrait donc contenir des cellules indifférenciées capables de se différencier en cellules endométriales. Cette théorie pourrait expliquer les cas d'endométriose chez l'homme et chez les femmes pré-pubères ainsi que les localisations à distance (hépatique, diaphragmatique, pleurale ou cérébrale²⁴).

c. Autres théories

D'autres théories tentent d'expliquer les lésions profondes et extra-péritonéales de l'endométriose :

- La théorie des résidus embryonnaires^{25,26} suggère que les cellules embryonnaires mésonéphrotiques et mülleriennes migreraient à la puberté vers la cloison recto-vaginale (sur le trajet des canaux de Müller)
- La théorie des métastases bénignes par voie lymphatique ou hémotogène propose une dissémination extra-péritonéale du tissu endométrial par les canaux lymphatiques (des fragments d'endométriose ont été retrouvés dans des ganglions lymphatiques) mais également par les veines utérines (Sampson trouva du tissu endométrial dans les veines utérines en 1927 « *Metastatic or embolic endometriosis, due to the menstrual dissemination of endometrial tissue into the venous circulation* »²⁷).
- Plus récemment, l'hypothèse de cellules souches^{28,29} provenant de la moelle osseuse et pouvant se différencier en tissu endométrial a vu le jour. Cette dernière théorie expliquerait la description d'endométriose chez des personnes n'ayant pas d'endomètre comme les hommes³⁰ ou les patientes présentant un syndrome de Rokitansky³¹⁻³³.

4. Épidémiologie

L'endométriose est une pathologie fréquente dont le taux exact est difficile à quantifier dans la population générale. Elle touche 5 à 10% des femmes en période d'activité génitale et 2.5% des femmes ménopausées^{34,35}. Néanmoins, le diagnostic définitif nécessite une exploration chirurgicale avec analyse histologique ce qui explique son sous-diagnostic. Une étude internationale de 2011 réalisée dans 10 pays et sur 5 continents chez des patientes symptomatiques ayant eu une première cœlioscopie montrait une incidence de l'endométriose allant de 35 à 100%³⁶. Les études réalisées chez des patientes infertiles retrouvent un taux d'endométriose allant de 5 à 50%. De plus, on retrouve de l'endométriose chez 4% des patientes fertiles opérées pour une demande de stérilisation tubaire³⁷. Une atteinte digestive est retrouvée chez 18% des patientes opérées d'endométriose³⁸.

L'incidence de l'endométriose a été retrouvée à 298 pour 100 000 personnes/années au cours de l'étude sur la santé des infirmières américaines (Nurses' Health Study II sur une cohorte prospective nationale représentative d'infirmières américaines âgées de 25 à 42 ans au moment de l'inscription en 1989). Il s'agissait d'une incidence à 10 ans avec un diagnostic d'endométriose confirmé par laparoscopie³⁹.

5. Clinique

L'endométriose présente une multitude de tableaux cliniques allant de la douleur pelvienne au pneumothorax cataménial.

La douleur est le signe le plus fréquent (75% des cas). Elle est très variée dans son intensité, sa localisation et sa cyclicité. L'argument le plus évocateur en faveur d'une endométriose est sa cyclicité puisqu'elle survient très fréquemment au moment des règles (douleurs cataméniales) ou en période péri-ovulatoire. La douleur peut également être permanente mais gardant tout de même une aggravation menstruelle caractéristique. Cette douleur est secondaire à l'inflammation des foyers endométriosiques qui saignent pendant les règles.

On retrouve 3 types principaux de douleurs :

- La dysménorrhée souvent invalidante et entraînant, dès la ménarche, un absentéisme scolaire puis professionnel.
- Les dyspareunies profondes liées à la mobilisation utérine au cours d'un rapport sexuel vaginal, en rapport avec une atteinte sous-péritonéale au niveau des ligaments utéro-sacrés ou de la cloison recto-vaginale.
- La dyschésie liée à une atteinte endométriosique digestive : le plus souvent au niveau de la cloison recto-vaginale mais pouvant également atteindre la totalité de la paroi du rectum voire du sigmoïde. On peut également trouver d'autres signes digestifs que l'on a particulièrement étudiés au cours de notre étude comme les diarrhées cataméniales, les douleurs anales, les rectorragies (qui sont très souvent liées à une atteinte digestive transfixiante atteignant la muqueuse digestive), le syndrome de Koenig (douleurs abdominales très brutales, principalement péri-ombilicales, transitoires et rapidement progressives liées à une sténose de l'intestin grêle parfois due à un nodule d'endométriose) voire un syndrome sub-occlusif ou occlusif par sténose infranchissable du tube digestif.

L'endométriose est responsable de près de 30 % des douleurs pelviennes chroniques, ce qui en fait une des premières causes avec les adhérences⁴⁰.

Toutefois, de nombreuses endométrioses sont asymptomatiques et il est parfois difficile d'affirmer que les lésions d'endométriose retrouvées lors de la coelioscopie sont responsables des douleurs qui avaient motivé cette intervention⁴¹. Une confirmation histologique est donc essentielle. Pour rattacher la douleur ressentie à l'endométriose observée, il faut rechercher

certaines paramètres évocateurs. Le caractère cyclique des douleurs reste l'élément le plus typique. De la même façon, des symptômes digestifs peuvent exister en l'absence de toute localisation digestive avérée de la maladie⁴². L'exploration systématique des symptômes dans une série consécutive de 355 patientes ayant bénéficié d'une coelioscopie pour suspicion d'endométriose a ainsi montré que des symptômes fonctionnels digestifs comme la diarrhée, la constipation, la présence de ballonnements, des nausées ou des vomissements étaient presque aussi fréquents que les symptômes purement gynécologiques chez les femmes porteuses d'endométriose et ne reflétaient pas forcément une atteinte digestive⁴³. Une des raisons avancées pour expliquer cette observation est le fait que les lésions d'endométriose, même lorsqu'elles n'atteignent pas directement les intestins, sont souvent situées dans le compartiment postérieur, à proximité du rectosigmoïde de telle façon que la sécrétion locale de prostaglandines associée à l'inflammation des lésions explique les troubles fonctionnels⁴⁴.

Même si la douleur chronique rythmée par le cycle reste le symptôme le plus fréquent, elle peut être absente voir atypique, ce qui rend le diagnostic difficile, d'autant plus dans les localisations peu fréquentes.

L'infertilité est un des grands tableaux cliniques de l'endométriose. En effet, on retrouve de l'endométriose chez 25 à 40% des patientes infertiles et le risque d'infertilité est multiplié par 10 en cas d'endométriose. Cette infertilité est souvent multifactorielle associant des troubles de l'implantation, des adhérences pelviennes et une insuffisance ovarienne liée aux endométriomes altérant le parenchyme ovarien.

L'endométriose entraîne également des ménorragies qu'il faudra quantifier et qui sont souvent liées à de l'adénomyose.

Il faut également rechercher des signes d'atteinte urinaire. Il s'agit le plus souvent d'une atteinte vésicale par un nodule endométriosique : hématurie macroscopique (parfois cataméniale), douleurs vésicales, pollakiurie. Ces signes cliniques arrivent préférentiellement en période pré-menstruelle ou menstruelle. On peut également rechercher une atteinte urétérale liée à un nodule d'endométriose sténosant ou obstruant l'uretère dont le tableau clinique peut être franc et sévère et révélé par une pyélonéphrite aigüe obstructive. Le tableau est parfois plus frustré avec une dilatation urétéro-pyélocalicielle découverte fortuitement ou à l'occasion d'un bilan urologique pour hématurie ou douleurs lombaires.

6. Examens complémentaires

Les recommandations de la Haute Autorité de Santé (HAS) de 2017⁴⁵ sur l'endométriose proposent de réaliser en première intention un examen clinique gynécologique ainsi qu'une échographie pelvienne (sus-pubienne et endo-vaginale) permettant de rechercher des signes évidents d'endométriose comme la présence d'un endométriome.

En deuxième intention ou chez une patiente présentant des signes cliniques d'endométriose profonde (dyspareunies, dyschésies, rectorragies...), il est recommandé de réaliser une IRM pelvienne⁴⁶⁻⁴⁸ (Figures 1 et 2) par un radiologue référent ou une échographie vaginale^{49,50} faite par un échographiste expérimenté. L'IRM pelvienne peut se faire après balisage vaginal et rectal si la préparation digestive n'a pas été réalisée afin de permettre une interprétation plus aisée de l'examen^{48,51,52}.

Figure 1 : IRM en séquence T1 sagittale avec injection de Gadolinium montrant une oblitération du cul-de-sac de Douglas par un nodule d'endométriose

Figure 2 : IRM en séquence T2 coupe sagittale montrant un nodule d'endométriose de la cloison recto-vaginale (balisage rectal)

En troisième intention, l'écho-endoscopie recto-sigmoïdienne⁵³⁻⁵⁵ (Figure 3), réalisée également par un opérateur entraîné, permet de définir plus précisément la distance de l'atteinte par rapport à la marge anale, le degré d'infiltration de la paroi digestive ainsi que la taille du nodule. Elle est souvent couplée à une coloscopie traditionnelle qui permet de rechercher d'autres atteintes ainsi que de juger de la « sévérité » de la lésion : degré de sténose, compression extrinsèque par un endométriome... Dans notre étude, une majorité de patientes bénéficiait d'une écho-endoscopie ainsi que d'une coloscopie par un gastroentérologue référent.

*Figure 3 : Echo-endoscopie recto-sigmoïdienne montrant les différents couches composant la paroi du rectum
(1)Muqueuse (2)Muscularis mucosae (3)Sous-muqueuse (4)Musculeuse (5) Séreuse*

Le coloscanner n'est que très peu utilisé par nos équipes, il a remplacé l'IRM dans certains centres (CHU Rouen Pr Roman). Il permet de faire un bilan complet des atteintes digestives et serait plus performant que l'IRM⁵⁶⁻⁵⁸ pour l'évaluation de l'atteinte de la charnière recto-sigmoïdienne et lors des oblitérations complètes du cul-de-sac de Douglas.

L'exploration d'une suspicion d'endométriose urinaire passe par l'échographie rénovésicale et des voies urinaires en première intention mais peut nécessiter une IRM pelvienne avec coupes hautes au niveau rénal ainsi qu'une cystoscopie pratiquée par un urologue formé aux atteintes endométriosiques.

Une cœlioscopie diagnostique peut également être proposée dans le bilan d'une endométriose pelvienne profonde. La classification des lésions en per-opératoire permettra d'évaluer l'atteinte afin d'anticiper le type de chirurgie.

7. *Classifications*

La classification révisée de l'American Fertility Society (AFSr) (*Figures 4 et 5*) est la plus utilisée, elle permet de corréler les lésions avec le degré d'atteinte. Cependant, elle n'évalue pas correctement le taux d'obtention d'une grossesse chez les patientes atteintes d'endométriose à la différence du score EFI (Endometriosis Fertility Index) qui a un meilleur pouvoir prédictif d'obtention d'une grossesse par fécondation in vitro (FIV) après traitement chirurgical d'une endométriose⁵⁹ (*Figure 6*).

La classification FOATI (*Figure 7*) a, quant à elle, été proposée par le groupe européen d'étude de l'endométriose, elle permet de prendre en compte l'inflammation péritonéale et est évolutive dans le temps.

Pour les lésions d'endométriose profonde, une classification a été proposée par Chapron et al⁶⁰ permettant de choisir le type de chirurgie à réaliser en fonction des lésions retrouvées : Deep Infiltrating Endometriosis (DIE classification) (*Figure 8*).

I - Lésions péritonéales		
Superficielles	Profondes	
< 1 cm	1	2
1 à 3 cm	2	4
> 3 cm	4	6
2 - Lésions ovariennes		
Ovaire droit	Superficielles	Profondes
< 1 cm	1	4
1 à 3 cm	2	16
> 3 cm	4	20
Ovaire gauche	Superficielles	Profondes
< 1 cm	1	4
1 à 3 cm	2	16
> 3 cm	4	20
3 - Adhérences		
Ovaire droit	Vélamenteuses	Denses
< 1/3	1	4
1/3 à 2/3	2	8
> 2/3	4	16
Ovaire gauche	Vélamenteuses	Denses
< 1/3	1	4
1/3 à 2/3	2	8
> 2/3	4	16
Trompe droite	Vélamenteuses	Denses
< 1/3	1	4*
1/3 à 2/3	2	8*
> 2/3	4	16
Trompe gauche	Vélamenteuses	Denses
< 1/3	1	4*
1/3 à 2/3	2	8*
> 2/3	4	16
* Si le pavillon de la trompe est complètement immobilisé (adhérent sur toute la circonférence), compter 16		
4 - Oblitération du Douglas		
Partielle	4	
Totale	40	
Stade de l'endométriiose	degré de sévérité	Score AFS
Stade I	endométriiose minime	1 - 5
Stade II	endométriiose modérée	6 - 15
Stade III	endométriiose moyenne	16 - 40
Stade IV	endométriiose sévère	> 41

Figure 4 : Score AFSr (American Fertility Society revised)

Figure 5 : Score AFSr (American Fertility Society revised)

LEAST FUNCTION (LF) SCORE AT CONCLUSION OF SURGERY

Score	Description	Left	Right
4	= Normal	☐	☐
3	= Mild Dysfunction	☐	☐
2	= Moderate Dysfunction	☐	☐
1	= Severe Dysfunction	☐	☐
0	= Absent or Nonfunctional	☐	☐

To calculate the LF score, add together the lowest score for the left side and the lowest score for the right side. If an ovary is absent on one side, the LF score is obtained by doubling the lowest score on the side with the ovary.

Lowest Score	☐	+	☐	=	<input type="text"/>
	Left		Right		LF Score

ENDOMETRIOSIS FERTILITY INDEX (EFI)

Historical Factors			Surgical Factors		
Factor	Description	Points	Factor	Description	Points
<u>Age</u>	If age is ≤ 35 years	2	<u>LF Score</u>	If LF Score = 7 to 8 (high score)	3
	If age is 36 to 39 years	1		If LF Score = 4 to 6 (moderate score)	2
	If age is ≥ 40 years	0		If LF Score = 1 to 3 (low score)	0
<u>Years Infertile</u>	If years infertile is ≤ 3	2	<u>AFS Endometriosis Score</u>	If AFS Endometriosis Lesion Score is < 16	1
	If years infertile is > 3	0		If AFS Endometriosis Lesion Score is ≥ 16	0
<u>Prior Pregnancy</u>	If there is a history of a prior pregnancy	1	<u>AFS Total Score</u>	If AFS total score is < 71	1
	If there is no history of prior pregnancy	0		If AFS total score is ≥ 71	0
Total Historical Factors			Total Surgical Factors		

EFI = TOTAL HISTORICAL FACTORS + TOTAL SURGICAL FACTORS: Historical + Surgical = EFI Score

ESTIMATED PERCENT PREGNANT BY EFI SCORE

Figure 6 : Score EFI (Endometriosis Fertility Index)

Facteurs principaux	0	1	2	3
F (foyer-péritoine) Diamètre cumulé	Sans lésion	< 1cm	1 à 5 cm	< 5 cm ou profond
O (endométriome ovarien) Mensuration par échographie ou autre imagerie*	Sans lésion	< 1 cm	1-5 cm	< 5 cm ou bilatéral
A (adhérence) avant toute lyse*	Sans lésion	Mobilité trompe et ovaire conservée	Conservation partielle mobilité trompe et/ou ovaire	Absence mobilité trompe et/ou ovaire
T (trompe = HSG ou autre)**	Sans lésion	Occlusion partielle (proximale ou distale)	Occlusion totale d'un côté + partielle de l'autre	Occlusion totale, bilatérale et permanente
I (inflammation)**	Hypervascularisation, Saignement au contact + si > 50 % de lésions rouges, sinon –			
C.D.S (cul-de-sac)	Sans lésion	Lésions superficielles des ligaments utérosacrés	Lésions profondes des ligaments utérosacrés	Septum recto-vaginal
Autres : E (intestins) U (urinaires)				
* Ajouter D, G si lésions unilatérales ou très asymétriques ** Facteurs additionnels				

Figure 7 : score FOATI (Foyer péritonéal-Endométriome-Adhérence-Trompe-Inflammation)

DIE classification	Operative procedure
A: Anterior DIE A1: Bladder	Laparoscopic partial cystectomy
P: Posterior DIE P1: Uterosacral ligament P2: Vagina	Laparoscopic resection of USL Laparoscopically assisted vaginal resection of DIE infiltrating the posterior fornix
P3: Intestine Solely intestinal location Without vaginal infiltration (V-) With vaginal infiltration (V+)	Intestinal resection by laparoscopy or by laparotomy Laparoscopically assisted vaginal intestinal resection or exeresis by laparotomy
Multiple intestinal location	Intestinal resection by laparotomy
USL = uterosacral ligament.	

Figure 8: Classification DIE (Deep Infiltrating Endometriosis) de Chapron et al

8. Facteurs de risque

a. Histoire menstruelle

Un âge précoce à la ménarche (<12 ans)⁶¹ et la présence de cycles courts (<26 jours)⁶² sont des facteurs de risque reconnus d'endométriose.

b. Parité

Des études cas-témoins⁶³ et une étude de cohorte³⁶ ont montré une diminution du risque d'endométriose chez les patientes ayant une parité.

c. Allaitement

Selon une étude récente (2017) de Ferland et al⁶⁴ sur la cohorte Nurses' Health Study II, la durée de l'allaitement maternel exclusif était significativement associée à une diminution du risque d'endométriose.

d. Poids

Le surpoids diminuerait l'incidence de l'endométriose^{65,66}. Ce phénomène s'expliquerait par l'oligo-anovulation voire l'aménorrhée induites par l'obésité. Néanmoins une étude cas-témoin australienne publiée en 2009 a montré une augmentation du risque d'endométriose chez les patientes obèses à l'âge de 10 ans⁶⁷ (Odds Ratio OR 2,8 ; IC 95% [1,1 – 7,5]). Cela pourrait s'expliquer par l'hyper-oestrogénie relative liée à un excès d'aromatases adipocytaires.

e. Sexe

Même si de rares cas d'endométriose masculine^{68,69} ont été décrits (notamment après traitement au long cours pour cancer de la prostate par hormonothérapie), il s'agit d'une pathologie quasi-exclusivement féminine.

f. Classe socio-économique

La prévalence de l'endométriose serait plus élevée chez les patientes venant de milieux socio-économiques favorables^{63,66} mais un biais lié à l'accès aux soins de patientes plus défavorisées n'est pas à exclure. De même, les patientes ayant suivi des études universitaires sont plus à risque de développer une endométriose⁶³.

g. Tabac – Sport

Le tabagisme important serait un facteur protecteur contre l'endométriose par un effet anti-oestrogène que l'on retrouve également chez les patientes pratiquant une activité sportive plus de 4h par semaine⁷⁰.

h. Contraception orale hormonale

La prise actuelle ou récente de contraception orale⁷¹ serait un facteur protecteur d'endométriose mais la contraception orale est également un traitement des dysménorrhées ce qui peut être à l'origine d'un biais important dans ces résultats.

i. Facteur familial

Le risque de développer une endométriose est cinq à six fois plus important lorsque la sœur est atteinte, et de quatre à huit fois plus important lorsqu'il s'agit de la mère^{72,73}. Ce risque est même de 75 % si la jumelle monozygote est atteinte d'endométriose. Il faut tout de même considérer un biais important d'information lié à la connaissance familiale de la maladie qui amène à des consultations plus fréquentes chez des patientes peu symptomatiques lorsqu'un membre de la famille est atteint.

j. Autres facteurs de risque

On retrouve d'autres facteurs de risque d'endométriose, parfois surprenants :

- Un âge au premier rapport sexuel élevé⁶³.
- La prématurité, la pré-éclampsie et le petit poids de naissance seraient des facteurs de risque de développer une endométriose⁷⁴.
- Certains gènes prédisposeraient à l'endométriose⁷⁵ en présence de facteurs environnementaux spécifiques.
- La taille serait un facteur de risque d'endométriose⁶⁶ : le risque de développer une endométriose est 3 fois plus important pour chaque tranche de 10cm de taille.
- Les consommatrices de vin blanc⁶⁶ seraient également plus à risque d'endométriose.

9. Transformation maligne

Le risque de transformation maligne de l'endométriome a été étudié. Sur les 21 études publiées, 20 ont retrouvé une association entre endométriome et cancer de l'ovaire pour les sous-types histologiques des carcinomes à cellules claires et endométrioïdes^{76,77}. Des cancers non gynécologiques ont également été étudiés notamment le mélanome cutané : 7 études ont suggéré une association positive entre mélanome et endométriome mais 5 études n'ont pas retrouvé d'association claire. L'étude de cohorte de Farland et al⁷⁸ sur 98 955 patientes françaises publiée en 2017 a montré une augmentation du risque de cancer cutané (Hazard Ratio HR 1.28, IC95% [1.05–1.55]) et plus particulièrement une augmentation du risque de mélanome (HR 1.64, IC95% [1.15–2.35]) chez les patientes atteintes d'endométriome confirmée chirurgicalement.

10. Traitement

Jusqu'à ce jour, qu'il soit médical ou chirurgical, le traitement est considéré comme symptomatique. Malgré une prise en charge chirurgicale optimale et complète, il existe de nombreux cas de récurrence (20% en moyenne, à 2 ans de la prise en charge chirurgicale initiale)^{79–82}.

a. Médical

Le principe du traitement médical est basé sur la suppression des menstruations en utilisant une pilule contraceptive, des progestatifs ou des analogues de la GnRH (Gonadotrophin-releasing hormone). Il s'agit d'un traitement symptomatique et non curatif dans la mesure où il ne permet pas la destruction des lésions.

L'endométriome est une pathologie oestrogène-dépendante, son traitement médical consiste donc en l'établissement d'un milieu hypo-oestrogénique ou hyper-progestatif. La contraception oestro-progestative (COP) induit une diminution de la sécrétion oestrogénique par inhibition centrale de la sécrétion de gonadotrophines. Il s'agit d'un traitement de première intention selon les recommandations de la HAS 2017⁴⁵ dont l'administration continue plutôt que cyclique entraîne une aménorrhée bénéfique chez des patientes souvent dysménorrhéiques.

Le dispositif intra-utérin au lévonorgestrel MIRENA est également un traitement médical de première intention notamment chez les patientes atteintes d'adénomyose.

Les progestatifs sont également efficaces dans le traitement de l'endométriose et ont fait la preuve de leur efficacité sur les douleurs liées à l'endométriose. Les micro-progestatifs comme le désogestrel (CERAZETTE), l'implant progestatif à l'etonogestrel (NEXPLANON) ainsi que les macro-progestatifs (acétate de nomégestrol LUTENYL) sont utilisés en continu pour induire une aménorrhée et diminuer les douleurs.

Les agonistes de la GnRH administrés en continu pour supprimer la fonction hypophysaire produisent un milieu hypo-oestrogénique et sont très efficaces contre la douleur⁸³ mais entraînent une ménopause artificielle à l'origine d'effets indésirables très gênants (syndrome climatérique, ostéoporose...). Un essai contrôlé randomisé réalisé en 2017 et publié dans le New England Journal of Medicine a montré que l'antagoniste oral de la GnRH, l'elagolix ORILISSA, était efficace contre les douleurs pelviennes associées à l'endométriose⁸⁴. Ce traitement présente l'avantage de sa prise orale et de l'absence d'effet « flare-up » mais a les mêmes effets indésirables liés à l'hypo-oestrogénie que les agonistes de la GnRH. Ce traitement n'est pour le moment pas recommandé par la HAS mais vient d'être approuvé par la Food and Drug Administration américaine le 23 juillet 2018.

Les antalgiques habituels doivent évidemment être prescrits chez les patientes douloureuses : antalgiques de paliers 1 à 3 (paracétamol, tramadol voire morphiniques), anti-inflammatoires non stéroïdiens (flurbiprofène ANTADYS) ...

b. Chirurgical

L'exérèse chirurgicale complète des lésions d'endométriose constitue l'un des piliers de la prise en charge de cette affection.

Le traitement chirurgical des endométrioses pelviennes minimales à légères (stades 1 et 2 de l'AFSr) nécessite une exérèse complète des lésions d'endométriose découvertes lors de la coelioscopie. Les différentes techniques d'exérèse (coagulation, péritonectomie...) ont des efficacités comparables sur l'amélioration des douleurs par rapport à une expectative simple^{85,86}. Chez les patientes opérées pour infertilité, le traitement des lésions visualisées associé à l'adhésiolyse pelvienne permet une augmentation du taux de grossesses spontanées^{87,88}. Selon le référentiel de la HAS 2017, il n'est pas recommandé de traiter chirurgicalement une endométriose péritonéale superficielle asymptomatique car rien ne prouve qu'elle évoluera vers une maladie symptomatique, il semble même qu'il y ait un risque de transformer une maladie asymptomatique en une maladie symptomatique.

Concernant les barrières anti-adhérentielles, elles n'ont pas montré d'intérêt dans la prévention des adhérences liées à l'endométriose^{89,90}.

Le traitement des endométriomes se fait par kystectomie intra-péritonéale par voie coelioscopique en évitant au maximum les coagulations bipolaires itératives à l'origine d'insuffisance ovarienne par diminution du capital folliculaire ovarien^{91,92}.

Il existe deux types de prise en charge chirurgicale de l'endométriose profonde infiltrant le rectum : les techniques conservatrices comme le shaving ou la résection discoïde et les techniques radicales que sont les résections colorectales segmentaires. En France, en 2015, plus de 1100 patientes ont été opérées d'endométriose profonde envahissant le rectum dont 48,1% par shaving rectal, 7,3% par exérèse discoïde et 40,4% par résection colorectale⁹³.

La résection rectale segmentaire (RRS) consiste en la résection du segment digestif atteint par l'endométriose profonde (*Figure 9*). Le geste chirurgical débute par la libération du rectum et du colon sigmoïde qui nécessite la résection du mésocolon et du mésorectum, puis par la section du rectum en dessous du nodule par une pince agrafeuse, enfin l'anastomose est réalisée par une pince agrafeuse trans-anale. Cette technique permet une amélioration des douleurs, de la fonction digestive et de la qualité de vie⁹⁴ avec un risque théorique de récurrence moindre car l'exérèse des foyers d'endométriose est plus complète que dans les autres techniques chirurgicales. Les inconvénients de la résection colorectale sont les risques à court terme comme les fistules digestives et les complications post-opératoires infectieuses ou hémorragiques mais aussi à moyen et à long terme avec le risque de sténose digestive et une possible aggravation de la fonction digestive.

Figure 9: résection iléo-caecale pour un nodule d'endométriose (flèches) transfixiant au niveau du caecum, pièce d'anatomopathologie après fixation⁹⁵

La résection discoïde (RD) consiste en l'ablation du nodule rectal d'endométriose sans réaliser de résection complète du segment atteint. Le premier temps opératoire est la réalisation d'un shaving rectal pour amincir et assouplir la zone atteinte. Le deuxième temps consiste en l'exérèse discoïde de la lésion. La RD concerne les nodules rectaux envahissant jusqu'à 50% de la circonférence rectale, elle ne peut pas être réalisée si la lésion est responsable d'une sténose importante du rectum, si elle est circulaire ou si son exérèse risque de créer une sténose au niveau de la suture digestive^{96,97}. L'avantage de cette technique est qu'elle permet une résection macroscopiquement complète tout en étant plus conservatrice pour le rectum et permet donc une amélioration plus importante de la fonction digestive en post-opératoire par rapport à la résection coloproctale. Cependant, la RD nécessite l'ouverture de la lumière digestive et la réalisation d'une suture sur le rectum ce qui augmente le risque théorique de fistule digestive et de complications infectieuses post-opératoires. De plus, la résection des lésions microscopiques d'endométriose n'est pas complète ce qui augmente le risque théorique de récurrences.

Le shaving rectal est défini comme l'excision de la lésion d'endométriose rectale avec résection de la musculature digestive si nécessaire, sans ouverture de la lumière digestive. Il peut parfois nécessiter une suture en cas de défaut de la musculature rectale⁹⁸. La chirurgie consiste d'abord en la séparation de la face antérieure du rectum et de la face postérieure du vagin. Puis le nodule endométriosique est progressivement disséqué et réséqué en prenant

soin de ne pas ouvrir la lumière digestive^{99,100}. Cette technique permet l'amélioration de la fonction digestive à long terme par rapport à une technique radicale comme la résection colorectale, ainsi qu'une diminution des risques opératoires et de complications post-opératoires par une dissection latérale moins importante permettant la préservation de l'innervation.

Problématique

Le choix du type de chirurgie employé dépend de nombreux facteurs : la taille du nodule d'endométriose, l'atteinte vaginale, la distance de la lésion par rapport à la marge anale, la profondeur de la lésion dans la paroi digestive, les atteintes associées... Ces différents facteurs sont analysés par le chirurgien et permettent de choisir la technique chirurgicale adaptée à la patiente.

Néanmoins, il n'existe aucune recommandation établie sur la technique chirurgicale adaptée et notamment sur la réalisation éventuelle d'une dérivation digestive (colostomie ou iléostomie) dans ce contexte de chirurgie à haut risque de complications.

En effet, le traitement chirurgical de l'endométriose pelvienne profonde avec atteinte digestive peut être à l'origine de nombreuses complications post-opératoires parfois sévères telles que les fistules recto-vaginales, la péritonite, l'abcès, les rectorragies... Ces complications digestives s'ajoutent aux complications « classiques » de la chirurgie de l'endométriose que sont les complications urinaires (plaie urétérale ou vésicale, urinome, rétention aigüe ou chronique d'urine...), gynécologiques (lâchage de suture de la cicatrice vaginale) mais également l'hémopéritoine, l'hématome...

Malgré une prise en charge chirurgicale optimale et complète qui s'apparente souvent sur le plan digestif à une chirurgie "carcinologique", il existe un risque de récurrence non négligeable⁷⁹⁻⁸². De plus, la morbidité décrite ci-dessus est difficilement tolérable chez ces patientes jeunes, souvent en âge de procréer et en activité sexuelle.

Objectif

L'objectif de cette étude était donc d'étudier de façon rétrospective les complications post-opératoires immédiates (< 30 jours post-opératoires) en fonction du type de chirurgie effectuée chez les patientes atteintes d'endométriose pelvienne profonde avec atteinte digestive, pour tenter de définir une prise en charge chirurgicale optimale et adaptée dans le but de réduire la morbidité post-opératoire.

MATERIELS ET METHODES

Il s'agit d'une étude rétrospective, multicentrique ayant inclus de Décembre 2012 à Janvier 2018, les patientes traitées chirurgicalement pour une endométriose pelvienne profonde avec atteinte digestive. Nous avons recueilli et analysé les données de la prise en charge chirurgicale et des suites post-opératoires immédiates.

Sélection des patientes, critères d'inclusion et d'exclusion

La sélection des patientes a été effectuée à partir de deux services de Chirurgie Gynécologique au CHU de Toulouse, ayant donné leur accord pour exploitation des données dans le cadre de cette étude : *le service de Chirurgie Générale et Gynécologique à Rangueil, et le service de Chirurgie Gynécologique à Paule de Viguié.*

Les patientes ont été sélectionnées selon l'intitulé de la chirurgie inscrit dans le logiciel du tableau opératoire : OPERA® Acertys.

Toutes les patientes présentaient une endométriose pelvienne profonde avec atteinte digestive nécessitant une prise en charge chirurgicale (shaving, résection discoïde ou résection rectale segmentaire). Les critères d'exclusion étaient l'absence de prise en charge chirurgicale digestive et le traitement de la récurrence digestive chez les patientes déjà opérées d'endométriose digestive au cours de la période d'inclusion dans nos centres.

Données cliniques

Pour chaque patiente, nous avons recueilli l'âge lors de la chirurgie, l'Indice de Masse Corporelle (IMC), la consommation tabagique, les antécédents chirurgicaux et obstétricaux. Nous avons également relevé les principaux symptômes que présentaient les patientes : douleurs pelviennes, dysménorrhées, méno-métrorragies, signes digestifs et urinaires, infertilité...

Modalités diagnostiques et thérapeutiques

Un bilan pré-thérapeutique par IRM pelvienne, coloscopie et échoendoscopie digestive était réalisé. Ces examens étaient effectués par des praticiens expérimentés et habitués aux pathologies endométriosiques. Néanmoins, une relecture centralisée par un radiologue entraîné à l'endométriose digestive était effectuée.

Toutes les patientes bénéficiaient en pré-opératoire d'une préparation digestive par phosphate de sodium type FLEET ainsi que de lavages rectaux systématiques.

La chirurgie était réalisée par coelioscopie robot-assistée (Da Vinci SI®), coelioscopie (2D) "conventionnelle" ou laparotomie. Deux chirurgiens ont pris en charge la majorité des patientes incluses. Le choix de la technique chirurgicale digestive (shaving, résection discoïde ou résection rectale segmentaire) dépendait de l'appréciation per-opératoire du chirurgien guidé par les données du bilan pré-opératoire (distance de la marge anale, taille du nodule d'endométriose, profondeur de l'atteinte dans la paroi digestive, nombre d'atteintes digestive et pelvienne, antécédents chirurgicaux, désir de grossesse, âge...).

Une réunion de concertation pluri-disciplinaire (RCP) mensuelle a été mise en place au niveau du CHU de Toulouse à partir de Décembre 2015. Les dossiers des patientes atteintes d'endométriose pelvienne profonde étaient discutés en présence de praticiens provenant des 2 centres participant à l'étude (CHU Toulouse Rangueil et Purpan) comprenant des chirurgiens gynécologues, des chirurgiens digestifs, des radiologues ainsi que des gynécologues spécialisés en aide médicale à la procréation.

Le shaving rectal était réalisé aux ciseaux froids ou aux ciseaux monopolaires en section à faible intensité (intensité 20 sur générateur ValleyLab™ ou DaVinci®). La résection discoïde du rectum se faisait également aux ciseaux froids ou à la section monopolaire et respectait la muqueuse rectale. La séreuse et la musculature étaient alors réparées en 2 plans par des surjets de fils tressés à résorption lente type Vicryl 3/0. En cas de résection segmentaire rectale, une anastomose était réalisée manuellement par voie coelioscopique "conventionnelle" ou robot-assistée par 2 hémi-surjets (antérieur et postérieur) au fil monofilament à résorption lente type PDS 4/0. Elle pouvait également être réalisée mécaniquement à l'aide d'une pince automatique circulaire type EEA Medtronic™ après section rectale à la pince TA Medtronic™ par mini-laparotomie transversale basse type Pfannenstiel (sur 4 à 5cm) ou par voie coelioscopique par endoGIA Medtronic™ pour réalisation de l'anastomose colo-rectale selon la technique trans-suturale de Knight.

Les données recueillies du compte rendu opératoire étaient : le type de chirurgie (shaving, résection discoïde, RRS ou résections multiples), la voie d'abord (coelioscopie robot-assistée, coelioscopie "simple", laparotomie ou laparoconversion), la durée opératoire, les pertes sanguines, le type d'anastomose en cas de RRS (manuelle ou mécanique, terminale ou latéro-terminale), sa localisation (colorectale ou coloanale) mais également tous les gestes chirurgicaux associés au niveau gynécologique (hystérectomie, ouverture vaginale, annexectomie...), digestif (colostomie ou iléostomie de protection, épiploplastie d'interposition, autre résection digestive associée...) et urologique (cystectomie partielle, urétérolyse).

Modalités de suivi

La surveillance post-opératoire a été effectuée en unité de surveillance continue ou dans les services de chirurgie gynécologique ou digestive.

Les données post-opératoires recueillies étaient : les complications post-opératoires immédiates notamment les fistules recto-vaginales, les hématomes ou infections ainsi que les reprises chirurgicales. Ces complications ont également été classées selon la classification de Clavien et Dindo¹⁰¹.

Un traitement médical post-opératoire par macroprogestatifs, contraception oestro-progestative ou analogues de la GnRH était parfois prescrit aux patientes n'ayant pas de projet de grossesse immédiat, afin de diminuer le risque de récurrence.

Les patientes étaient revues en consultation post-opératoire à 6 semaines de la chirurgie puis en consultation de surveillance à un an avant d'être à nouveau confiées à leur gynécologue. Les récurrences post-opératoires ont également été relevées.

Analyse statistique

Les variables qualitatives ont été décrites à l'aide d'effectifs et de pourcentages, les variables quantitatives par leurs moyennes et écarts-types, médianes et intervalles interquartiles. Les caractéristiques des sujets ont été comparées en fonction de la technique chirurgicale utilisée par des tests du chi² ou des tests exacts de Fisher (si les effectifs théoriques étaient inférieurs à 5) pour les variables qualitatives et par des ANOVA ou des tests non paramétriques de Kruskal-Wallis (en cas de distribution non normale ou de non-homogénéité des variances) pour les variables quantitatives. Les facteurs associés au risque de complication (toutes complications) ou de fistule recto-vaginale ont été recherchés par des modèles de régression logistiques univariées puis multivariées. Les odds-ratio associés au risque de complications sont présentés ainsi que leurs intervalles de confiance à 95%. L'adéquation des modèles a été évaluée par des tests d'Hosmer et Lemeshow. Les interactions ont été testées dans le modèle final entre les variables statistiquement significatives. Tous les tests étaient bilatéraux, le risque alpha fixé à 5%. Les analyses statistiques ont été réalisées à l'aide du logiciel STATA V14 (College Station, TX: StataCorp LP).

RESULTATS

Il s'agit d'une étude rétrospective, descriptive et multicentrique.

Caractéristiques des patientes (Tableau 1)

Sur les 176 patientes traitées entre le 31 Décembre 2012 et le 1^{er} Janvier 2018, nous avons inclus 164 patientes et exclu 12 patientes (9 patientes ont été opérées pour une récurrence d'endométriose digestive sur cette période et 3 patientes n'ont finalement eu aucun geste digestif au cours de la chirurgie). L'âge moyen des patientes était de 34,4 ans (min = 17 – max = 48 ans). 32,8% des patientes étaient tabagiques, l'IMC moyen était de 21,7kg/m². 60,4% (n=99) des patientes présentaient des antécédents chirurgicaux abdominaux, 54,9% par coelioscopie (n=90), 9,8% par laparotomie (n=16), 47,0% pour endométriose (n=77) et 7,9% de césariennes (n=13). Sur le plan obstétrical, 67,1% étaient nullipares (n=108), 17,4% étaient primipares (n=28) et 15,5% étaient multipares (n=25). Comme attendu chez des patientes jeunes, le score ASA était de 1 dans 86,2% des cas (n=94, missing=55) et de 2 dans 13,8% des cas (n=15). 30,5% des patientes (n=50) ont consulté pour infertilité et 95,1% de patientes (n=156) ont consulté pour symptomatologie douloureuse (symptomatologie répertoriée dans le tableau 2).

Tableau 1 : Caractéristiques de la population

Caractéristiques	moyenne	écart-type	
IMC (kg/m ²)	21,7	4,9	
Age (années)	34,4	6,3	
	n	%	Missing
Parité			4
• Nullipare	108	67,1	
• Primipare	28	17,4	
• Multipare	25	15,5	
• Césarienne	13	7,9	
Tabagique	41	32,8	39
Antécédent de chirurgie abdominale	99	60,4	0
Antécédent de chirurgie pour endométriose			0
• aucun	87	53	
• 1	43	26,2	
• 2	19	11,6	
• ≥ 3	15	9,2	
Traitement néoadjuvant			4
• Aucun	23	14,3	
• Analogues de la GnRH	130	80,7	
• Macroprogestatif	7	4,3	
• Microprogestatif	1	0,6	
Score ASA			55
• 1	93	85,3	
• 2	16	14,7	

GnRH = Gonadotropin Releasing Hormone ; ASA = American Society of Anesthesiologists

Tableau 2 : Symptomatologie

Symptomatologie	n	%
Dysménorrhées	129	78,7
Dyspareunies	105	64
Douleurs abdomino-pelviennes	111	67,7
Méno-métrorragies	30	18,3
Digestifs	124	75,6
Urinaires	37	22,6
Paucisymptomatique	9	5,5
Symptômes urinaires	37	22,6
Pollakiurie	20	12,2
Dysurie	17	10,4
Hématurie	1	0,6
Douleurs mictionnelles	7	4,3
Symptômes digestifs	124	75,6
Dyschésie	104	63,4
Rectorragies	20	12,2
Diarrhées	29	17,7
Constipation	22	13,4

Les patientes bénéficiaient d'un traitement néoadjuvant dans 85,7% des cas (n=138), il s'agissait d'analogues de la GnRH dans 80,7% des cas (n=130) pour une durée médiane de 3 mois et une durée moyenne de 4,3 mois [min = 3 - max = 84 mois], de macroprogestatifs dans 4,3% des cas et de microprogestatifs pour une patiente. 14,3% des patientes (n=23, missing=3) n'avaient pas de traitement néoadjuvant.

Caractéristiques de la pathologie (Tableau 3)

Tableau 3 : Profondeur de l'atteinte en écho-endoscopie et en coloscopie

Echo-endoscopie	n	%
Pas d'atteinte	40	26,7
Séreuse	32	21,3
Musculeuse	27	18
Muqueuse	51	34
Missing	14	

Coloscopie	n	%
Pas d'atteinte	70	51,5
Atteinte visible	39	28,7
Sténose digestive	20	14,7
Compression extrinsèque	7	5,1
Missing	28	

En écho-endoscopie, les nodules endométriosiques mesuraient en moyenne 28,1mm [+/- 16,9mm], ils étaient situés en moyenne à 11,8cm [+/-5,4cm] de la marge anale et atteignaient la couche muqueuse dans 34,0% des cas (n=51), la couche musculuse dans 18,0% des cas (n=27) et la couche séreuse dans 21,3% des cas (n=32). Il n'y avait pas d'envahissement digestif à l'écho-endoscopie dans 26,7% des cas (n=40, missing=14). La coloscopie retrouvait une sténose digestive chez 20 patientes (14,7%). L'IRM pelvienne retrouvait un endométriome unilatéral dans 20,1% des cas (n=33), bilatéral dans 22,0% des cas (n=36), un kistose ovarien dans 12,8% des cas (n=21), une atteinte des ligaments utéro-sacrés dans 40,9% des cas (n=67), de l'adénomyose dans 17,7% des cas (n=29), une atteinte de la vessie dans 10,4% des cas (n=17) et du vagin dans 6,1% des cas (n=10). Une RCP avait été réalisée en pré-opératoire chez 21 patientes (12,8%).

Les résultats anatomopathologiques retrouvaient de l'endométriose sur la ou les pièce(s) opératoires dans 92,7% (n=152) des cas.

Caractéristiques de la chirurgie

Concernant la chirurgie, une coelioscopie robot-assistée était réalisée chez 122 patientes (74,4%), une coelioscopie "conventionnelle" chez 36 patientes (21,9%) et une laparotomie chez 6 patientes (3,7%). Une laparoconversion a été nécessaire chez une patiente dont l'exploration per-opératoire retrouvait une atteinte plus importante que prévu nécessitant plusieurs résections digestives ayant entraîné une conversion en laparotomie. La chirurgie initialement prévue était une RRS par coelioscopie robot-assistée avec exérèse d'un nodule vésical.

52,4% (n=86) de patientes ont bénéficié d'un shaving, 9,1% (n=15) d'une RD, 28,7% (n=47) d'une RRS et 9,8% (n=16) d'une résection d'au moins 2 nodules digestifs (groupe "chirurgie multiple" : Tableau 4).

Tableau 4 : Gestes digestifs réalisés dans le groupe "chirurgie multiple"

Chirurgie	n	%
Shaving + RD	8	50,0
Shaving + RRS	3	18,8
RD + RRS	4	25,0
RD + RRS + résection iléo-caecale	1	6,2

RD = résection discoïde ; RRS = résection rectale segmentaire

Concernant les patientes ayant eu une RRS, l'anastomose était le plus souvent colo-rectale (87,2% ; n=41) termino-terminale (97,9% ; n=46) et mécanique (59,6% ; n=28). Pour les autres RRS, l'anastomose était manuelle dans 40,4% des cas (n=19), colo-anale dans 12,8% des cas (n=6), iléo-colique dans 4,3% des cas (n=2) et latéro-terminale pour 1 patiente (2,1%). Une épiploplastie était réalisée dans 17% (n=8) des cas de RRS. La réalisation d'une dérivation digestive temporaire a été faite dans 11,6% des cas (n=19), il s'agissait d'une iléostomie pour 12 patientes et d'une colostomie chez 7 patientes. L'intervention était réalisée avec un chirurgien digestif dans 16,5% (n=29) des cas. Les gestes chirurgicaux associés à la chirurgie principale sont énumérés dans le tableau 5.

Tableau 5 : Gestes chirurgicaux associés

Geste chirurgical associé	n	%
Gestes gynécologiques associés	142	86,6
Aucun	22	13,4
Kystectomie	66	40,2
Annexectomie unilatérale	5	3,0
Annexectomie bilatérale	15	9,4
Hystérectomie	24	14,6
Colpectomie	66	40,2
Ouverture vaginale (= colpectomie + hystérectomie)	90	54,9
Ligaments utéro-sacrés	34	20,7
Péritonectomie vésico-utérine	32	19,5
Péritonectomie autre	25	15,2
Salpingectomie uni ou bilatérale	17	10,4
Nodule pariétal	2	1,2
Gestes digestifs associés	65	39,6
Aucun	99	60,4
Résection grêle	3	1,8
Résection caecum	3	1,8
Appendicectomie	9	5,5
Colectomie	3	1,8
Sigmoïdectomie	8	4,9
Adhésiolyse	51	31,1
Nodule caecum	2	1,2
Gestes urologiques associés	103	62,8
Aucun	61	37,2
Cystectomie partielle	6	3,7
Urétérolyse unilatérale	38	23,2
Urétérolyse bilatérale	63	38,4
Réimplantation urétéro-vésicale	2	1,2
Résection diaphragmatique	2	1,2

La durée opératoire moyenne était de 152min [+/- 79min], les pertes sanguines moyennes étaient de 123cc [+/- 104cc]. Une antibioprophylaxie per-opératoire (Tableau 6) était le plus souvent administrée par voie intra-veineuse par Céfazoline 2 grammes (37,9% des cas) ou par Amoxicilline-Acide Clavulanique 2 grammes (35,6% des cas).

Tableau 6 : Antibioprophylaxie

Antibiotiques	n	%
Céfazoline	25	37,9
Amoxicilline-Acide Clavulanique	24	36,4
Dalacine + Gentamicine	4	6,1
Flagyl + Gentamicine	12	18,2
Cefoxitime	1	1,5
Missing	98	58,5

Caractéristiques post-opératoires

La durée moyenne d'hospitalisation était de 8,2 jours [+/- 9,8 jours]. Un traitement adjuvant était prescrit dans 57,9% (n=95) des cas, il s'agissait majoritairement d'un macroprogestatif pour 48,2% des patientes (n=79), d'un analogue de la GnRH pour 7,3% des patientes (n=12) et d'un microprogestatif pour 2,4% des patientes (n=4). Le taux de récurrence d'endométriose était de 6,7% (n=11).

Une complication (Tableau 7), quelle qu'elle soit, survenait dans 37,8% (n=62) des cas avec nécessité d'une reprise chirurgicale dans 18,3% (n=30) des cas. Une transfusion a été nécessaire chez une patiente. Quinze patientes (9,1%) ont présenté une atonie vésicale nécessitant un apprentissage des auto sondages. On retrouvait une fistule recto-vaginale post-opératoire chez 16 patientes (9,8% des cas), une fistule vésico-vaginale chez 3 patientes (1,8%). Une antibiothérapie post-opératoire (Tableau 8) a dû être introduite dans 28,0% (n=46) des cas, il s'agissait le plus souvent d'une bi-antibiothérapie intra-veineuse dans 60,0% des cas (n=27).

Tableau 7 : Complications post-opératoires

Complications	n	%
Hématome	14	8,5
Hémorragie	6	3,7
Abcès	10	6,1
Fistule recto-vaginale	16	9,8
Fistule anastomotique	3	1,8
Fistule vésico-vaginale	3	1,8
Péritonite	1	0,6
RAU	2	1,2
Rétention chronique	15	9,1
Rectorragie	1	0,6
Stomie (nécrose, prolapsus)	3	1,8
Sténose anastomotique	1	0,6
Médicale (fièvre, infection urinaire...)	31	18,9

Tableau 8 : Antibiothérapie post-opératoire

Antibiothérapie	n	%
Ceftriaxone + Metronidazole	9	5,5
Pipéracilline-Tazobactam + Gentamicine	5	3,0
Ofloxacine + Metronidazole	2	1,2
Amoxicilline-Acide Clavulanique	7	4,3
Cefixime	2	1,2
Ofloxacine	5	3,0
Autre antibiothérapie	18	10,5
Pas d'antibiothérapie	117	71,3

Sur l'ensemble de la population, on retrouvait 18,3% (n=30) de complications de grade 3a ou 3b selon la classification de Clavien et Dindo (Tableau 9, *Figure 10*) avec nécessité de reprise chirurgicale. Deux patientes ont présenté des complications de grade 4a ayant nécessité un séjour en réanimation : 1 patiente a présenté un choc septique sur péritonite stercorale après lâchage de suture de l'anastomose colorectale à J4 post-opératoire et 1 patiente a fait un choc hémorragique avec hémopéritoine et Coagulation Intra-Vasculaire Disséminée (CIVD) à J4 post-opératoire ayant nécessité une hospitalisation de 14 jours en réanimation.

Tableau 9 : Complications post-opératoires selon la classification Clavien & Dindo¹⁰¹

Clavien & Dindo	n	%
1	8	12,9
2	22	35,5
3a	1	1,6
3b	29	46,8
4a	2	3,2
4b	0	0
5	0	0

<p>Grade 1 Toute déviation des suites postopératoires sans utilisation de médicaments (autres que ceux listés ci-dessous) ou d'interventions chirurgicale, endoscopique ou radiologique Les médicaments tels que antiémétiques, antipyrétiques, analgésiques, diurétiques, électrolytes sont autorisés, de même que la physiothérapie. Ce grade inclut aussi l'ouverture de la plaie pour drainage d'un abcès sous-cutané au lit du malade</p>
<p>Grade 2 Complication nécessitant un traitement médicamenteux, y compris la transfusion de sang/plasma ou l'introduction non planifiée d'une nutrition parentérale</p>
<p>Grade 3 a) Complication nécessitant une intervention chirurgicale, endoscopique ou radiologique en anesthésie autre que générale b) Complication nécessitant une intervention chirurgicale, endoscopique ou radiologique en anesthésie générale</p>
<p>Grade 4 Complication vitale nécessitant un séjour aux soins intensifs a) Dysfonction d'un seul organe (y compris dialyse) b) Dysfonction multiorganique</p>
<p>Grade 5 Décès du patient</p>

Figure 10 : Classification de Clavien et Dindo¹⁰¹ des complications post-opératoires

Analyse de la prise en charge chirurgicale en fonction des caractéristiques des patientes et de la maladie

Les facteurs étudiés sont présentés dans le tableau 10. On ne retrouvait pas de différence significative entre les patientes sur l'âge, l'IMC, le tabac, la gestité, les antécédents chirurgicaux. On notait cependant une différence significative entre shaving, résection discoïde (RD), RRS et chirurgie multiple sur les douleurs abdomino-pelviennes et les symptômes digestifs pré-opératoires, qui étaient significativement plus importants dans les groupes RRS et chirurgie multiple que dans les 2 autres groupes : 83,0% de douleurs abdomino-pelviennes (n=38) dans le groupe RRS et 75,0% (n=12) dans le groupe chirurgie multiple vs 60,0% (n=39) dans le groupe RD et 59,3% (n=51) dans le groupe shaving (p=0,030). De même, dans les symptômes digestifs, on retrouvait une différence significative concernant les dyschésies et les rectorragies qui sont plus fréquentes dans les groupes RRS et chirurgie multiple que dans les autres groupes.

Par contre, la distance du nodule par rapport à la marge anale était comparable dans les 4 groupes (10,7cm ; 11,1cm ; 12,6cm et 13,1cm respectivement pour les groupes shaving, RD, RRS et chirurgie multiple). On notait également que la confection d'une dérivation digestive (stomie) avait été réalisée dans 34,1% des cas (n=16, p=0,001) lors d'une RRS et dans 18,8% des cas (n=3, p=0,001) lors d'une chirurgie multiple.

Tableau 10 : Comparaison Shaving/Discoïde/RRS/Chirurgie multiple

	Shaving		Discoïde		RRS		Chirurgie multiple		p
	n	+/-	n	+/-	n	+/-	n	+/-	
IMC	21,9	4,8	20,7	3,3	21,3	4,5	23,7	7,1	0,500
Age	33,5	6,6	35,9	7,0	35,2	5,7	35,2	5,0	0,330
	n	%	n	%	n	%	n	%	p
Score ASA = 1	50	81,9	12	100	22	91,7	10	83,3	0,297
Score ASA = 2	11	18,1	0	0	2	8,3	2	16,7	0,297
Tabac	20	29,9	5	38,5	12	36,4	4	33,3	0,866
ATCD de chir abdominale	48	55,8	8	53,3	32	68,1	11	68,8	0,638
ATCD chir endométriose	34	39,5	7	46,7	26	53,3	10	62,5	0,319
Gestité	n	%	n	%	n	%	n	%	p
Nullipare	53	62,4	11	73,3	31	68,9	13	81,3	0,799
Primipare	15	17,6	2	13,3	10	22,2	1	6,3	0,799
Multipare	17	20	2	13,3	4	8,9	2	12,5	0,799

	Shaving		Discoïde		RRS		Chirurgie multiple		
Traitement néoadjuvant	n	%	n	%	n	%	n	%	p
Agoniste de la GnRH	72	84,7	14	93,3	30	65,2	14	93,3	0,017
Macroprogestatif	2	2,4	0	0	5	10,9	0	0	0,017
Aucun	11	12,9	0	0	11	23,9	1	6,7	0,017
Symptômes gynécologiques	n	%	n	%	n	%	n	%	p
Dysménorrhées	67	77,9	11	73,3	37	78,7	14	87,5	0,816
Dyspareunies	57	66,3	6	40	32	68,1	10	62,5	0,231
Douleurs abdomino-pelviennes	51	59,3	9	60	39	83	12	75	0,030
Méno-métrorragies	17	19,8	3	20	8	17	2	12,5	0,940
Digestifs	62	72,1	10	66,7	43	91,5	9	56,3	0,006
Urinaires	21	24,4	5	33,3	10	21,3	1	6,3	0,292
Paucisymptomatique	3	3,5	3	20	2	4,3	1	6,3	0,095
Symptômes urinaires	n	%	n	%	n	%	n	%	p
Pollakiurie	14	16,3	2	13,3	4	8,5	0	0	0,246
Dysurie	7	8,1	2	13,3	7	14,9	1	6,3	0,566
Hématurie	0	0	0	0	1	2,1	0	0	0,476
Douleurs mictionnelles	5	5,8	2	13,3	0	0	0	0	0,087
Symptômes digestifs	n	%	n	%	n	%	n	%	p
Dyschésie	53	61,6	8	53,3	37	78,7	6	37,5	0,017
Rectorragies	4	4,7	2	13,3	13	27,7	1	6,3	0,001
Diarrhées	16	18,6	2	13,3	6	12,8	5	31,3	0,398
Constipation	11	12,8	3	20	6	12,8	2	12,5	0,873
Syndrome de Koenig	2	2,4	0	0	5	10,6	0	0	0,128
Vomissements	1	1,2	0	0	1	2,1	0	0	1,000
Echo-endoscopie	n	+/-	n	+/-	n	+/-	n	+/-	p
Taille nodule (mm)	15,8	7,5	31,4	20,5	34,3	13,6	34,6	22,3	0,092
Distance de la MA (cm)	10,7	5,9	11,1	3,1	12,6	5,6	13,1	4,7	0,280
IRM	n	%	n	%	n	%	n	%	p
Kissing ovarien	11	12,8	1	6,7	3	6,4	6	37,5	0,024
Endométriome unilatéral	15	17,4	0	0	13	27,7	5	31,3	0,047
Endométriome bilatéral	18	20,9	7	46,7	7	14,9	4	25	0,092
Cloison recto-vaginale	72	83,7	14	93,3	30	63,8	15	93,8	0,011
Envahissement digestif	54	62,8	14	93,3	41	87,2	12	75	0,004
Chirurgie	n	%	n	%	n	%	n	%	p
Iléostomie	0	0	0	0	10	21,3	2	12,5	0,001
Colostomie	0	0	0	0	6	12,8	1	6,3	0,001
Epiploplastie	1	1,2	1	6,7	8	17	1	6,3	0,003

ATCD = antécédent ; chir = chirurgie ; GnRH = Gonadotropin Releasing Hormone ; MA = marge anale ; ASA = American Society of Anesthesiologists

Analyse des complications en fonction de la prise en charge chirurgicale (Tableau 11)

La durée opératoire et les pertes sanguines étaient significativement plus importantes lors d'une RRS (respectivement 218min en moyenne et 168cc en moyenne) que lors d'une RD ou d'un shaving (189min pour RD, 123min pour shaving et 108cc pour RD, 107cc pour shaving ; $p < 0,001$ pour la durée opératoire et $p = 0,043$ pour les pertes sanguines).

On retrouvait également plus de complications en générale et plus de reprises chirurgicales dans le groupe RRS que dans les groupes RD et shaving. Une antibiothérapie post-opératoire était nécessaire dans plus de la moitié des chirurgies de type RRS (52,5% $n = 31$, $p < 0,001$). Les complications de grades 2 et 3 selon Clavien et Dindo étaient significativement plus fréquentes dans le groupe RRS que dans les groupes RD et shaving.

Tableau 11 : Comparaison des complications en fonction du type de chirurgie

	Shaving		Discoïde		RRS		Chirurgie multiple		p
	n	+/-	n	+/-	n	+/-	n	+/-	
Pertes sanguines (cc)	105	52	145	104	163	184	118	36	0,890
Durée opératoire (min)	136	69	147	77	190	104	157	66	0,810
Durée d'hospitalisation (jours)	6,1	8,1	9,1	7,6	10,1	5,4	13,6	21,3	0,001
Complications	n	%	n	%	n	%	n	%	
Total	13	15,1	7	46,7	30	63,8	12	75	0,001
Reprise chirurgicale	9	10,5	2	13,3	16	34	4	25	0,009
Antibiothérapie	9	10,5	5	33,3	24	51,1	8	50	0,001
Classification Clavien et Dindo	n	%	n	%	n	%	n	%	
Grade 1	1	1,2	2	13,3	3	6,4	2	12,5	0,188
Grade 2	3	3,5	3	20	11	23,4	5	31,3	0,188
Grade 3a	1	1,2	0	0	0	0	0	0	0,188
Grade 3b	8	9,3	2	13,3	16	34,0	3	18,7	0,188
Grade 4	0	0	0	0	0	0	2	12,5	0,188

Analyse univariée

Enfin, une analyse univariée a permis de montrer que le risque de complications en général (Tableau 12) et de fistule recto-vaginale en particulier (Tableau 13) augmente de manière significative en cas d'ouverture vaginale (complications en général : Odds Ratio (OR) 3,17 ; IC95% [1,64 -6,12] ; $p < 0,001$ et fistule recto-vaginale : OR 27,69 ; IC95% [3,56 – 215,58] ; $p < 0,001$), d'atteinte visible en coloscopie (complications en général : OR 24,30 ; IC95% [2,98 – 197,68] ; $p < 0,001$ et fistule recto-vaginale : OR 3,67 ; IC95% [1,12 – 12,02] ; $p = 0,032$) et si l'anastomose est manuelle au cours d'une RRS (complications en général : OR 16,15 ; IC95% [5,08 – 51,38] ; $p < 0,001$ et fistule recto-vaginale : OR 34,67; IC95% [6,92 – 173,74] ; $p < 0,001$). De plus, en analyse univariée, la dérivation digestive n'apparaît pas être un facteur protecteur de fistule recto-vaginale.

Tableau 12 : Analyse univariée pour l'ensemble des complications

Variable étudiée	OR	IC95%	p
IMC < 19,5	1,02	0,31 – 1,80	0,992
IMC > 23,5	0,97	0,41 – 2,29	0,992
Tabac	0,94	0,33 – 2,67	0,902
Antécédent de chirurgie abdominale	1,19	0,62 – 2,27	0,605
Antécédent de laparotomie	2,30	0,81 – 6,54	0,117
Antécédent de chirurgie pour endométriose	1,22	0,65 – 2,29	0,542
Echo-endoscopie rectale	OR	IC95%	p
Taille nodule 15 - 40 mm	3,50	0,37 – 32,97	0,114
Taille nodule > 40 mm	3,48	0,99-12,24	0,114
Distance de la marge anale 8 - 12 cm	1,17	0,45 – 3,05	0,483
Distance de la marge anale > 12 cm	1,71	0,67 – 4,37	0,483
Atteinte séreuse	2,33	0,68 – 8,00	<0,001
Atteinte musculuse	7,54	2,26 – 25,11	<0,001
Atteinte muqueuse	12,83	4,28 – 38,52	<0,001
IRM pelvienne	OR	IC95%	p
Envahissement digestif	2,94	1,30 – 6,67	0,010
Taille nodule 15 – 40mm	3,50	0,37 – 32,97	0,016
Taille nodule > 40mm	18,00	1,75 – 184,68	0,016
Coloscopie	OR	IC95%	p
Atteinte visible	24,30	2,98 – 197,68	< 0,001
Chirurgie	OR	IC95%	p
RRS vs shaving	9,91	4,29 – 22,91	< 0,001
RD vs shaving	4,91	1,52 – 15,89	< 0,001
Chirurgie multiple vs shaving	16,85	4,70 – 60,36	< 0,001
Ouverture vaginale	3,17	1,64 – 6,12	0,001
Geste urinaire associé	2,57	1,28 – 5,18	0,008
Epiploplastie	1,40	0,41 – 4,81	0,589
Stomie	4,24	1,52 – 11,85	0,006
Anastomose manuelle	16,15	5,08 – 51,38	< 0,001
Anastomose mécanique	2,56	1,13 – 5,80	< 0,001
Durée opératoire > 120min	1,17	0,41 – 3,29	0,771
Pertes sanguines > 100cc	1,29	0,47 – 3,53	0,615

Tableau 13 : Analyse univariée pour les fistules recto-vaginales (n=16)

Variable étudiée	OR	IC95%	p
IMC < 19,5	1,32	0,35 – 5,05	0,606
IMC > 23,5	0,63	0,13 – 3,00	0,606
Tabac	1,03	0,33 – 3,23	0,963
Antécédent de chirurgie abdominale	0,91	0,38 – 2,18	0,826
Antécédent de laparotomie	2,40	0,60 – 9,51	0,214
Antécédent de chirurgie pour endométriose	1,51	0,54 – 4,28	0,435
Echo-endoscopie rectale	OR	IC95%	p
Taille nodule > 40 mm	3,50	0,90 – 13,61	0,071
Distance de la marge anale 8 - 12 cm	0,69	0,20 – 2,38	0,247
Distance de la marge anale > 12 cm	0,29	0,72 – 1,25	0,247
Atteinte séreuse	2,60	0,22 – 30,05	0,027
Atteinte musculuse	1,50	0,09 – 25,06	0,027
Atteinte muqueuse	10,73	1,32 – 87,07	0,027
IRM pelvienne	OR	IC95%	p
Envahissement digestif	5,94	0,76 – 46,42	0,089
Taille nodule > 40mm	4,13	0,61 – 27,78	0,145
Coloscopie	OR	IC95%	p
Atteinte visible	3,67	1,12 – 12,02	0,032
Chirurgie	OR	IC95%	p
RRS vs shaving	32,50	4,09 – 258,19	< 0,001
RD vs shaving	6,07	0,36 – 102,77	NS
Chirurgie multiple vs shaving	5,67	0,34 – 95,61	NS
Ouverture vaginale	27,69	3,56 – 215,58	0,002
Geste urinaire associé	4,64	1,02 – 21,17	0,047
Epiploplastie	0,92	0,11 – 7,69	0,939
Stomie	8,81	2,79 – 27,86	< 0,001
Anastomose manuelle	34,67	6,92 – 173,74	< 0,001
Anastomose mécanique	7,17	1,25 – 41,13	< 0,001
Durée opératoire > 120min	1,33	0,31 – 5,74	0,699
Pertes sanguines > 100cc	2,11	0,42 – 10,58	0,366

Analyse multivariée

En analyse multivariée, l'Odds Ratio (OR) pour une complication post-opératoire (Tableau 14) était de 20,87 (IC95% [1,96 – 221,79] ; p=0,012) si la technique chirurgicale employée était une RRS et de 3,18 (IC95% [1,33 – 7,62] ; p=0,01) s'il y avait une ouverture vaginale au cours de la chirurgie (colpectomie ou hystérectomie totale). Pour la fistule recto-vaginale (Tableau 15), l'OR est de 22,71 si la chirurgie était une RRS (IC95% [2,74 – 188,01] ; p=0,005) et de 19,67 (IC95% [2,43 – 159,18] ; p=0,005) s'il y avait une ouverture vaginale.

Tableau 14 : Analyse multivariée sur le risque de complications en général

Variable	OR	IC95%	p
RRS	20,87	1,96 – 221,79	0,012
Chirurgies multiples	19,73	3,02 – 128,83	0,002
RD	3,49	0,93 – 13,14	0,065
Ouverture vaginale	3,18	1,33 – 7,62	0,010
Stomie	1,38	0,30 – 6,31	0,674
Anastomose manuelle	1,27	0,15 – 1,02	0,826
Anastomose mécanique	0,18	0,02 – 1,97	0,161
Distance de la marge anale en EE ≤ 8 cm	0,53	0,15 – 1,87	0,328
Distance de la marge anale en EE 8-12cm	0,46	0,13 – 1,61	0,226
Distance de la marge anale en EE ≥ 12 cm	1,10	0,37 – 3,31	0,859

RRS = résection rectale segmentaire ; RD = résection discoïde ; EE = écho-endoscopie

Tableau 15 : Analyse multivariée sur le risque de fistule recto-vaginale

Variable	OR	IC95%	p
RRS	22,71	2,74 – 188,01	0,005
Chirurgies multiples	5,20	0,29 – 94,71	0,316
RD	5,26	0,29 – 95,93	0,211
Ouverture vaginale	19,67	2,43 – 159,18	0,005
Stomie	2,74	0,77 – 9,68	0,118
Anastomose manuelle	4,94	0,17 – 146,50	0,356
Anastomose mécanique	0,87	0,02 – 31,61	0,939
Distance de la marge anale en EE ≤ 8 cm	0,95	0,22 – 4,13	0,950
Distance de la marge anale en EE 8-12cm	0,35	0,03 – 4,03	0,403
Distance de la marge anale en EE ≥ 12 cm	0,19	0,04 – 0,94	0,042

RRS = résection rectale segmentaire ; RD = résection discoïde ; EE = écho-endoscopie

DISCUSSION

Il n'existe à ce jour aucun essai contrôlé randomisé comparant l'approche radicale et conservatrice dans la prise en charge des patientes porteuses d'endométriose colorectale sur des lésions comparables (dans l'attente des résultats de l'étude ENDORE de Roman et al). De même, aucune étude comparative ne permet de recommander une technique chirurgicale en termes de taux de récurrence, de complications post-opératoires ou de résultats fonctionnels. Le choix de la stratégie chirurgicale digestive (RRS, RD, shaving, réalisation d'une dérivation digestive, épiploplastie...) reste aujourd'hui affaire d'école, d'expérience personnelle et de conception de l'endométriose.

Néanmoins, notre étude a mis en évidence plusieurs facteurs de risques de complications post-opératoires liées aux caractéristiques de la maladie, des patientes, et de la chirurgie.

Dans notre étude, nous retrouvons un taux de complications de 37,8% (n=62) avec nécessité d'une reprise chirurgicale dans 18,3% (n=3) des cas, ce qui représentait une complication de grade 3a ou 3b selon la classification de Clavien et Dindo¹⁰¹, dont la présence de fistule recto-vaginale post-opératoire chez 16 patientes (9,8% des cas) et de fistule vésico-vaginale chez 3 patientes (1,8%). Deux patientes ont présenté des complications de grade 4a ayant nécessité un séjour en réanimation : 1 patiente a présenté un choc septique sur péritonite stercorale après lâchage de suture de l'anastomose colorectale à J4 post-opératoire et 1 patiente a fait un choc hémorragique avec hémopéritoine et CIVD à J4 post-opératoire ayant nécessité une hospitalisation de 14 jours en réanimation.

Facteurs pourvoyeurs de complications en fonction de la population

Certains facteurs propres aux patientes peuvent favoriser la survenue d'une complication post-opératoire comme par exemple le tabac, le score ASA, la dénutrition... Notre étude s'est intéressée à des patientes atteintes d'endométriose souvent jeunes et présentant peu de comorbidités. De ce fait, toutes les patientes de notre série présentaient un score ASA à 1 ou 2. Dans nos analyses univariées et multivariées, aucun facteur propre aux patientes (IMC, tabac, antécédents chirurgicaux...) n'a pu être mis en évidence comme étant un facteur de risque indépendant de complication post-opératoire après chirurgie d'endométriose pelvienne profonde avec atteinte digestive.

Oliveira et al¹⁰², dans une large revue de la littérature réalisée en 2015 sur les complications chirurgicales de l'endométriose digestive, ont étudié les différentes options thérapeutiques permettant de diminuer le risque de complications post-opératoires. Ils se sont appuyés sur de nombreuses publications ayant étudié les résections colo-rectales dans le cadre des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin (comme la maladie de Cröhn) et la chirurgie carcinologique. En pré-opératoire, un taux faible d'albumine¹⁰³ (inférieur à 3,5 g/dL, OR 2.8; IC95% [1.3-5.1]) et de protéines totales¹⁰⁴ était associé à une augmentation du risque de fuite anastomotique. De même, un score American Society of Anesthesiologists ASA ≥ 3 était associé à un risque plus important de fuite anastomotique en post-opératoire¹⁰⁵, mais cela ne concerne que peu de patientes atteintes d'endométriose qui sont le plus souvent jeunes et en bonne santé, comme dans notre série.

Facteurs pourvoyeurs de complications liés à l'atteinte endométriosique

Notre série montre que le risque de complications en général et de fistule recto-vaginale en particulier augmente de manière significative en cas d'atteinte endométriosique visible en coloscopie, d'atteinte muqueuse en écho-endoscopie et en cas de nodule mesurant plus de 40mm ou envahissant le tube digestif en IRM (uniquement pour les complications en général). Ces données du bilan pré-opératoire sont donc fondamentales pour l'information des patientes en consultation mais également pour le chirurgien afin d'adapter le geste chirurgical.

L'atteinte endométriosique la plus souvent évoquée comme facteur de risque potentiel de complication post-opératoire est la distance du nodule par rapport à la marge anale. En effet, le traitement chirurgical des lésions rectales basses (< 5 à 8cm de la marge anale) est plus à risque de fistules recto-vaginales, de fuites anastomotiques et de dysfonctions vésicales transitoires¹⁰⁶⁻¹⁰⁸.

Dans notre série, nous ne retrouvons pas d'augmentation significative du risque de complications post-opératoires en cas de lésions situées à moins de 8cm de la marge anale.

Facteurs pourvoyeurs de complications en fonction de la chirurgie

La résection rectale segmentaire

Dans notre étude, la majorité des complications post-opératoires sévères nécessitant une reprise chirurgicale a eu lieu après une résection segmentaire rectale ou lors du traitement chirurgical de multiples nodules d'endométriose.

Certains auteurs comme Roman¹⁰⁹ et al en 2015 dans une étude prospective ont montré la faisabilité de la « technique de Rouen » qui consiste à réaliser une exérèse de la lésion du bas ou du moyen rectum par voie trans-anale en utilisant la pince Contour 30 d'Ethicon après avoir effectué un shaving de la lésion par voie coelioscopique à l'aide de l'énergie Plasma. Cette technique évite une résection rectale segmentaire basse et permet l'exérèse de nodules d'endométriose mesurant jusqu'à 8cm de plus grand axe. Elle permet également la résection de lésions multifocales si elles sont séparées par au moins 5cm de tube digestif sain. Dans cette étude, 50 patientes opérées pour un nodule d'endométriose rectale mesurant de 25 à 80mm par résection discoïde ont été étudiées. 26% des patientes (n=13) ont présenté une complication de grade 3 de la classification de Clavien et Dindo dont 2 fistules recto-vaginales (4%), 1 patiente a présenté des rectorragies et 1 autre une fistule vésico-vaginale après résection vésicale. Huit patientes (16%) ont présenté une atonie vésicale nécessitant 3 semaines à 6 mois d'auto-sondages.

Les résultats de notre étude ne retrouvent pas de lien entre le taux de complications et la distance de l'atteinte endométriosique par rapport à la marge anale.

Dans une revue de la littérature publiée en 2011 par De Cicco et al¹¹⁰, les auteurs décrivaient les complications post-opératoires de 1889 patientes ayant eu une résection digestive pour endométriose profonde et ne trouvaient pas de lien entre le taux de complications et la hauteur de la résection par rapport à la marge anale. Ils trouvaient un taux global de complications de 22,2% dont 11% de complications majeures : 1,8% de fistules recto-vaginales, 1,9% de fuites anastomotiques et 2,5% d'hémopéritoïnes. Ils notaient également une atonie vésicale chez 8,1% des patientes.

Notre étude retrouvait en analyse multivariée, un OR pour une complication post-opératoire de 20,87 (IC95% [1,96 – 221,79] ; p=0,012) si la technique chirurgicale employée était une RRS. Cependant, les RRS étaient réalisées chez des patientes présentant des nodules de taille et de profondeur significativement plus importantes que chez les patientes ayant eu une résection discoïde ou un shaving (chez qui ces 2 dernières techniques chirurgicales auraient été difficilement réalisables).

En outre, dans une étude sur la symptomatologie globale post-opératoire, Kent et al⁹⁹ ont mis en évidence un faible taux de complications après RRS: sur 108 patientes étudiées, 36,1% ont eu un shaving, 6,5% une résection discoïde et 57,4% une RRS. Une seule colostomie a été réalisée pour protéger une anastomose colo-rectale basse. Concernant les complications post-opératoires, une patiente a eu une fuite anastomotique nécessitant une reprise chirurgicale avec colostomie, 2 patientes ont présenté des collections pelviennes traitées médicalement, 2 syndromes obstructifs gréliques ont été traités médicalement, une sténose anastomotique a été dilatée sous anesthésie générale et une sténose urétérale a également nécessité une dilatation. Seules 4 laparoconversions ont été nécessaires (2,9%), il n'y a pas eu de fistule recto-vaginale. Ces résultats sont surprenants en termes de complications post-opératoires étant donné qu'il ne s'agissait que d'endométrioses sévères de stade 4 de l'ASFr (American Fertility Society revised) avec oblitération complète du cul de sac de Douglas chez toutes les patientes. Malgré 57% de RRS, seule une patiente a eu une stomie de protection et les auteurs n'ont signalé aucune fistule recto-vaginale. Ces résultats montrent moins de complications que dans notre étude et la seule différence dans la prise en charge consiste en un traitement néoadjuvant systématique par agonistes de la GnRH pour une durée de 6 mois dans l'étude de Kent.

En effet, les patientes de notre étude bénéficiaient d'un traitement néoadjuvant dans 85,7% des cas et il s'agissait d'analogues de la GnRH dans 80,7% des cas mais pour une durée moyenne de 4,3 mois seulement.

On retrouve de rares études¹¹¹ ayant tenté de démontrer l'effet des analogues de la GnRH en pré-opératoire afin de diminuer l'inflammation locale liée à l'endométriose et ainsi faciliter la chirurgie. Une étude multicentrique prospective de 1998¹¹² a comparé l'efficacité d'un traitement néo adjuvant versus un traitement adjuvant par analogues de la GnRH chez des patientes atteintes d'une endométriose stades 3 et 4. Les auteurs ont trouvé une différence significative sur le score AFSr dans le groupe de patientes ayant eu une administration néo

adjuvante d'analogues. Ils n'ont par contre pas pu conclure sur une éventuelle action permettant de faciliter la chirurgie d'exérèse. Muzii et al¹¹³ furent les premiers en 1996 à effectuer une étude prospective randomisée sur 20 patientes évaluant l'intérêt de l'analogue de la GnRH en pré-opératoire pour chirurgie d'endométriome. Aucune différence entre les groupes n'a été constatée concernant la durée globale de l'intervention, la durée pour la kystectomie, le temps et le nombre de coagulations nécessaires pour obtenir une hémostase satisfaisante.

Ces données sont résumées dans le référentiel de la HAS de 2017⁴⁵ qui ne recommande pas l'utilisation systématique d'un traitement hormonal pré-opératoire dans le seul but de faciliter la chirurgie ou de diminuer le risque de récurrence.

Néanmoins, cette thérapeutique pré-opératoire par agonistes de la GnRH permet, dans notre étude, de diminuer les douleurs en attendant la date opératoire qui est souvent programmée 2 à 3 mois après la première consultation afin de compléter le bilan pré-opératoire.

Ouverture vaginale

Concernant l'ouverture vaginale associée à un geste digestif, notre étude en analyse multivariée a permis de retrouver un Odds Ratio à 19,67 (IC95% [2,43 – 159,18] ; p=0,005) pour le risque de fistule recto-vaginale en cas d'ouverture vaginale au cours de la chirurgie.

Ces données sont comparables avec celles de l'équipe parisienne de l'hôpital Ténon (Belghiti et al¹¹⁴) qui ont montré dans une étude de cohorte prospective sur 198 patientes opérées d'une RRS pour endométriose un taux de fistule recto-vaginale de 4,5% (n=9). Toutes les fistules recto-vaginales de cette étude sont survenues chez des patientes présentant une anastomose colorectale basse (p<0,001) et 88% (8 sur 9) chez des patientes ayant eu une ouverture vaginale (p<0,001).

Dans nos équipes, la réparation des fistules recto-vaginales se faisait en un ou deux temps selon l'importance de l'orifice fistuleux. En effet, devant une fistule peu symptomatique sur le plan général (sous-péritonéale) avec des signes scannographiques indirects de fistules (bulles d'air par exemple), une colostomie temporaire était mise en place pour une durée de 3 mois avant réalisation d'une opacification rectale basse radiologique. Si celle-ci ne

retrouvait plus de trajet fistuleux, nous programmions rapidement une fermeture de cette colostomie. En cas d'orifice fistuleux évident cliniquement ou chez une patiente symptomatique, nous réalisons une fermeture en 2 temps : dans un premier temps une colostomie était réalisée afin « d'assécher » ce trajet fistuleux puis dans un second temps nous pratiquons la réparation de cette fistule, le plus souvent avec une interposition d'épiploon (épiploplastie) si celle-ci n'avait pas été réalisée au cours de la chirurgie initiale et un rétablissement de continuité était programmé à 3 mois après vérification clinique et radiologique de la fermeture de cette fistule. Certains auteurs^{115,116} proposent pour leur part un traitement conservateur par régime sans résidu, surveillance clinique et monitoring biologique (formule leucocytaire et C-reactive protein CRP) chez des patientes asymptomatiques ne présentant pas d'épanchement abdominal. Plus récemment, certaines équipes¹¹⁷⁻¹¹⁹ ont proposé la réparation des fistules recto-vaginales en utilisant des bioprothèses de sous-muqueuse intestinale porcine dont les résultats sont pour le moment comparables à ceux des lambeaux d'avancement classiques.

Réalisation d'une dérivation digestive

Dans notre étude, nous avons pratiqué une dérivation digestive temporaire chez 19 patientes (11,6%) sans pouvoir montrer d'effet significatif sur la diminution des complications post-opératoires, probablement par leur nombre limité et leur réalisation uniquement chez des patientes à fort risque de complications lié à l'importance de leur atteinte endométriosique.

Les recommandations de la HAS de Décembre 2017⁴⁵ sur l'endométriose proposent la réalisation d'une dérivation digestive temporaire (iléostomie ou colostomie), à discuter avec la patiente, en cas de chirurgie d'endométriose du bas rectum, il s'agit d'un accord d'expert dans l'attente d'études de haut niveau de preuve.

L'équipe de Strasbourg d'Akladios et al¹²⁰ a publié en 2015 une étude sur 41 patientes opérées d'une résection sigmoïdienne chez 6 patientes, rectale haute chez 21 patientes et rectale basse (<10cm de la marge anale) chez 14 patientes. Une fistule anastomotique a été retrouvée chez une patiente qui avait eu une anastomose non protégée. Les autres complications post-opératoires comprenaient un hémopéritoine, un abcès pelvien et une fistule urétéro-vaginale (2,4% chacun). Les auteurs concluaient qu'une stomie protectrice

pouvait être évitée en cas d'anastomose à plus de 5 cm de la marge anale en l'absence d'évènement per-opératoire particulier.

La chirurgie rectale de l'endométriose se rapproche de la chirurgie carcinologique du rectum. Une revue de la Cochrane de Montedori et al¹²¹ a étudié l'intérêt de la pratique d'une stomie systématique chez des patients opérés d'un cancer du rectum dans 6 essais contrôlés randomisés. Ils ont pu comparer un groupe de 332 patients ayant eu une stomie systématique versus 316 patients n'ayant pas eu de stomie de protection après résection antérieure basse rectale. Les auteurs ont montré que dans cette chirurgie rectale oncologique, l'utilisation d'une stomie de protection est associée à une diminution des fuites anastomotiques (RR 0.33; 95%IC [0.21- 0.53]) et des reprises chirurgicales en urgence (RR 0.23; 95%IC [0.12 - 0.42]). Il n'y avait pas de différence significative en termes de mortalité (RR 0.58; 95%IC [0.14 - 2.33]).

Ledu et al¹²² ont publié en 2017 une étude cas-témoin rétrospective multicentrique comparant un groupe de 33 patientes opérées pour endométriose rectale avec stomie de protection (groupe S) avec un groupe de 14 patientes n'ayant pas eu de stomie de protection (groupe NS) pour le même type de chirurgie. Les taux de complications post-opératoires et de fuites anastomotiques étaient sensiblement plus importants, sans être significatifs, dans le groupe NS que dans le groupe S (57% de complications post-opératoires dans le groupe NS vs 48% dans le groupe S, $p = 0,75$ et 21% de fuites anastomotiques pour le groupe NS vs 3% pour le groupe S $p = 0,073$). La qualité de vie post-opératoire, évaluée par le questionnaire standardisé SF-36, était significativement améliorée par la chirurgie dans les 2 groupes. Cependant ces données sont difficilement reproductibles puisque les 2 groupes n'étaient pas totalement comparables. En effet, dans le groupe S, 64% des patientes avaient une RRS, 30% avaient une résection discoïde par voie trans-anale selon la « technique de Rouen », 1 patiente avait une résection discoïde par voie intra-péritonéale et 1 patiente a été stomisée après une plaie rectale lors d'un shaving. Or, dans le groupe NS, 93% des patientes ($n=13$) avaient une RRS et une patiente avait une résection discoïde selon la « technique de Rouen », ce groupe était donc plus à risque de complications post-opératoires et de fuite anastomotique puisque la RRS est une chirurgie entraînant un taux plus important de complications post-opératoires selon les données récentes sur le sujet.

Concernant le choix entre la réalisation d'une iléostomie ou d'une colostomie afin de protéger l'anastomose colorectale, les données de la littérature ne sont pas formelles. En effet, 2 méta-analyses^{123,124} dont l'une de la Cochrane ne retrouvent pas d'argument évident pour proposer l'une ou l'autre des techniques. On retrouve moins de complications post-opératoires avec l'iléostomie (hernies pariétales et infections de paroi) après rétablissement de continuité mais le volume de selles est plus important avec une iléostomie ce qui peut être à l'origine de troubles hydro-électrolytiques et de brûlures cutanées.

Dans notre étude, sur les 19 dérivations digestives temporaires (dont 12 iléostomies et 7 colostomies) mises en place, 3 d'entre elles se sont compliquées : une sténose sur une iléostomie ayant nécessité une réfection chirurgicale de la stomie et 2 abcès péri-stomiaux sur des colostomies, traités médicalement.

Autres facteurs

Notre étude montre une augmentation significative des complications post-opératoires en général et de fistule recto-vaginale en particulier en cas de geste urinaire associé (urétérolyse uni ou bilatérale, cystectomie partielle), ce qui est probablement dû à l'atteinte endométriosique plus importante avec infiltration du tractus urinaire chez ces patientes.

Ces atteintes du tractus urinaire par des nodules d'endométriose a récemment fait l'objet d'une étude Suisse de Knabben et al¹²⁵ ayant montré que la probabilité d'urétérolyse uni ou bilatérale était corrélée à la taille du nodule d'endométriose évalué en pré-opératoire. Il y a donc un lien direct entre l'importance de l'atteinte endométriosique et le risque d'urétérolyse per-opératoire. Les auteurs proposaient également une classification des atteintes urétérales de l'endométriose allant du simple recouvrement de l'uretère (grade 0) au rein non fonctionnel (grade 5). Une autre étude de Saavalainen et al¹²⁶ publiée en 2016 sur 53 patientes opérées d'endométriose atteignant le système urinaire montrait un taux de complications post-opératoires de 53% (4% de complications de grade 1 de Clavien et Dindo, 40% de grade 2 et 9% de grade 3). Il s'agit donc de patientes présentant des maladies endométriosiques souvent très évoluées et donc plus à risques de complications post-opératoires.

On retrouve également, dans notre étude, un taux plus important de complications post-opératoires en cas d'anastomose manuelle lors d'une RRS : OR à 16,15 pour les complications en général (IC95% [5,08 – 51,38] ; $p < 0,001$) et OR à 34,67 pour les fistules recto-vaginales (IC95% [6,92 – 173,74] ; $p < 0,001$).

Une revue de la littérature de la Cochrane¹²⁷ de 2012 sur 1233 patients comparant 622 patients ayant eu une anastomose colorectale mécanique avec 611 patients ayant eu une anastomose colorectale manuelle pour tous types de chirurgies colorectales, ne retrouvait pas de différence significative sur la mortalité, la fistule anastomotique, la durée d'hospitalisation et sur les complications post-opératoires entre les 2 techniques d'anastomose. Cette étude ne permettait pas de montrer la supériorité d'une technique anastomotique par rapport à l'autre.

Dans notre série, les patientes ayant bénéficié de l'exérèse de multiples nodules d'endométriose digestive ont eu des complications post-opératoires dans 75% des cas (n=12) et une reprise chirurgicale dans 25% des cas (n=4). Il s'agit donc d'une chirurgie dont les risques de complications post-opératoires sont très importants et qu'il convient de prévenir par l'utilisation de dérivations digestives de protection ou d'épiploplasties en cas d'anastomose digestive. Il est également nécessaire d'effectuer une préparation colique optimale en pré-opératoire.

Concernant la préparation digestive, les patientes de notre étude bénéficiaient systématiquement d'une préparation colique et rectale.

L'intérêt d'une préparation digestive pré-opératoire, a été étudié par une méta-analyse de la Cochrane de 2011¹²⁸ ne montrant pas de différence significative sur le taux de fuite anastomotique entre les patients ayant eu une préparation digestive ou un lavement et les patients n'ayant eu aucune préparation avant une chirurgie rectale basse. A contrario, un essai randomisé de 2006¹²⁹ a montré une augmentation du taux de fistule chez des patients (n=147) ayant eu une résection colorectale après préparation pré-opératoire par lavement rectal simple (n=147) en comparaison avec les patients ayant eu une préparation digestive par 3 litres de Polyéthylène Glycol (n=147) : 4,1 vs 0%, $p = 0.013$; RR 2,04 (IC95% [1,82 - 2,30]).

Dans notre série, toutes les patientes ont reçu une antibioprofylaxie per-opératoire.

Une revue de la Cochrane¹³⁰ impliquant 260 essais et 43 451 patients a montré que par rapport au placebo, l'antibioprofylaxie diminuait l'incidence des infections de site opératoire de 75% (RR = 0,34; IC 95% [0,28 – 0,41]).

Dans notre étude, la durée opératoire moyenne était de 152min [+/- 79min] et les pertes sanguines de 123cc [+/- 104min].

Telem et al¹⁰³ ont montré dans une étude cas-témoin (90 patients présentant une fuite anastomotique après résection colorectale comparés à 180 patients n'ayant pas eu de complication) une augmentation du risque de fuite anastomotique lorsque la durée opératoire était supérieure ou égale à 200 minutes (OR = 3,4; IC95% : [2,0 - 5,8]; p = 0,01) ou que la perte de sang per-opératoire était supérieure ou égale à 200cc (OR = 3,1; IC95% : [1,9 - 5,3] ; p = 0,01) ou lorsqu'une transfusion était nécessaire au cours de l'intervention (OR = 2,3 ; IC95% : [1,2 – 4,5] ; p = 0,02).

L'étude de la durée opératoire et des pertes sanguines sur le risque de complications post-opératoires n'a pas permis de retrouver de résultats significatifs dans notre série mais les données comparées étaient plus faibles (durée opératoire > 120min et pertes sanguines > 100cc dans notre série versus durée opératoire > 200min et pertes sanguines > 200cc dans l'étude de Telem et al).

Dans notre série, une épiploplastie a été réalisée dans 17% des cas lorsque la résection rectale segmentaire était associée à une ouverture vaginale sans montrer de diminution significative de l'incidence des complications post-opératoires.

Le faible nombre de cas représentant ce geste chirurgical pourrait expliquer ces résultats. En outre, l'épiploplastie étant le plus souvent réalisée chez les patientes ayant une maladie avancée avec RRS et ouverture vaginale associée (très à risque de complications comme nous l'avons mis en évidence), la question de la réalisation conjointe d'une épiploplastie et d'une dérivation digestive de protection doit être discutée chez ces patientes.

Une étude de 2015 de Wiggins et al¹³¹ a montré dans une méta-analyse de 3 essais prospectifs randomisés que l'épiploplastie systématique lors des anastomoses colorectales est associée

à une diminution non significative du risque de fistule anastomotique (5,0% dans le groupe épiploplastie vs 8,4% dans le groupe sans épiploplastie ; OR = 0,50; IC95% : [0,21 – 1,17]). Cependant ces résultats concernent des résections colorectales pour causes carcinologiques et ne s'appliquent probablement pas à nos RRS avec ouverture vaginale en regard.

L'étanchéité de l'anastomose colorectale était systématiquement testée dans notre série.

Ricciardi et al¹³² ont montré dans une étude de cohorte sur 998 anastomoses que les anastomoses testées en per-opératoire et présentant une fuite d'air avaient plus de risque d'entraîner secondairement une fuite clinique que les anastomoses testées sans fuite d'air (7,7% vs 3,8% p<0,03). De même, en cas de fuite d'air au moment du test, la simple réparation de la fuite augmente le risque de fuite post-opératoire clinique par rapport à la réfection complète de l'anastomose ou à la stomie de protection en amont de l'anastomose testée (12,2% vs 0% et 0% p=0,19).

Dans notre série, la mise en évidence d'une fuite d'air était le plus souvent réparée par la réalisation de points simples séparés sans réfection de l'anastomose ni réalisation de stomie. Néanmoins, nous n'avons pas pris en compte ce facteur dans l'analyse du caractère protecteur de la stomie, du fait d'un manque de données exhaustives concernant le déroulement et la chronologie du test de l'anastomose dans le compte rendu opératoire.

Chirurgie radicale ou conservatrice ?

Concernant le débat entre chirurgie radicale ou conservatrice dans le traitement de l'endométriiose pelvienne profonde avec atteinte digestive, il nous semble que celui-ci n'a pas vraiment lieu d'être. En effet, les indications chirurgicales sont différentes, une chirurgie radicale étant indiquée lors d'atteintes multiples, de nodule circonférentiel de taille importante ou situé à moins de 5cm de la marge anale ou de lésion sténosante. De nombreuses études montrent les avantages de la chirurgie conservatrice sur les suites opératoires sans montrer d'amélioration de la qualité de vie. Il semble effectivement que la chirurgie conservatrice est à proposer en première intention si elle est possible. Une publication très récente de Jayot et al⁹⁶ (2018) a comparé la chirurgie conservatrice par résection discoïde (RD) à une chirurgie radicale par résection rectale segmentaire (RRS) par coelioscopie dans les 2 cas, au cours d'une étude rétrospective incluant 31 patientes dans

chaque groupe. La résection discoïde était associée à un temps opératoire plus court (155 vs 180 minutes, $p = 0,03$) et à un séjour à l'hôpital moins long (7 vs 8 jours, $p = 0,002$) que la résection rectale segmentaire. Les auteurs n'ont pas trouvé de différence en termes de complications post-opératoires en dehors d'un taux plus élevé de dysfonctionnement mictionnel dans le groupe des résections segmentaires (19% vs 45%, $p = 0,03$). Cependant les 2 groupes n'étaient pas comparables puisque les lésions du groupe RRS étaient significativement plus larges que celles du groupe RD (19mm [min = 0 – max = 32] vs 15mm [min = 0 – max = 25] ; $p = 0,02$).

Les données de la littérature ainsi que nos résultats montrent que la RRS est effectuée dans la majorité des cas lors des atteintes endométriosiques digestives de gros volume. Aussi, la résection discoïde ainsi que le shaving sont difficilement envisageables chez ces patientes. Le débat entre chirurgie radicale ou conservatrice n'est donc pas la problématique car le geste semble justifié. L'enjeu est donc d'encadrer la RRS : réalisation d'une dérivation digestive, d'une épiploplastie ou d'une chirurgie en 2 temps (un premier temps digestif puis un second temps gynécologique et vaginal ?

Réunion de Concertation Pluridisciplinaire (RCP) dédiée à l'endométriose

En Décembre 2015, une réunion de concertation pluridisciplinaire dédiée à l'endométriose a été mise en place sur le CHU de Toulouse. Cette RCP regroupe les praticiens des centres de Purpan et de Rangueil tous les mois depuis cette date. Les dossiers compliqués d'endométriose sont discutés entre chirurgiens, radiologues et médecins d'aide médicale à la procréation (AMP) avant la prise en charge chirurgicale des patientes. Dans notre série, seuls 24 dossiers (13,6%) ont été discutés en RCP. Cela s'explique par la mise en place tardive de ces réunions mensuelles mais également par la décision de ne discuter que les dossiers considérés comme difficiles ou nécessitant l'avis d'un médecin d'AMP avant la prise en charge chirurgicale. La HAS⁴⁵ recommande depuis 2017 la discussion en « RCP endométriose » des dossiers d'endométriose en cas d'échec du traitement initial, de récurrence ou d'atteinte de plusieurs organes ainsi qu'en cas d'échec d'une ou plusieurs tentatives de FIV dans un contexte d'endométriose.

Apports et limites de notre étude

Notre étude s'est intéressée aux complications post-opératoires de la chirurgie de l'endométriose digestive. Il s'agit d'une étude multicentrique de bonne puissance sur 164 patientes consécutives sur une période de 5 ans. Il existe néanmoins plusieurs limites : il s'agit d'une étude rétrospective avec une hétérogénéité de prise en charge (opérateurs différents ayant posé des indications différentes devant une population très hétérogène de patientes et travaillant dans des conditions différentes : coelioscopie exclusive, cœlioscopie robot-assistée, multidisciplinarité...) ne permettant pas de comparer l'efficacité des techniques chirurgicales entre elles de manière optimale. De plus, le nombre d'évènements indésirables et notamment de fistules recto-vaginales étant faible (n=16), la qualité de l'analyse multivariée peut être remise en cause sur le plan statistique.

Chirurgie de l'endométriose profonde et qualité de vie

Il est également important de préciser que la chirurgie de l'endométriose est une chirurgie difficile dont les complications sont parfois graves mais qui permet une amélioration de la qualité de vie des patientes au niveau des douleurs pelviennes chroniques, des dysménorrhées, et des autres atteintes douloureuses liées à l'endométriose, ainsi que des indices de qualité de vie à 6 et 12 mois de la chirurgie. Kent⁹⁹ et al ont étudié l'évolution des plaintes liées à l'endométriose avant et après chirurgie d'endométriose pelvienne profonde à 2, 6 et 12 mois post-opératoires par différentes échelles de qualité de vie (endometriosis health profile 30 (EHP-30), EuroQol-5 dimension (EQ-222 5D), Gastro-intestinal Quality of Life Index (GIQLI), Echelle Visuelle Analogique (EVA) pour les dysménorrhées, les dyspareunies, les douleurs pelviennes chroniques et la dyschésie. Sur 108 patientes étudiées, 36 ont eu une "chirurgie pelvienne radicale" (hystérectomie avec annexectomie bilatérale) et 72 ont eu un traitement chirurgical conservateur de l'utérus et des ovaires, 36,1% ont eu un shaving, 6,5% une résection discoïde et 57,4% une RRS. Une seule colostomie a été réalisée pour protéger une anastomose colo-anale basse. Leurs résultats retrouvent une amélioration post-opératoire de toutes les données étudiées ($p < 0,01$). A 12 mois, les patientes ayant eu une "chirurgie pelvienne radicale" avaient significativement moins de douleurs et une meilleure fonction digestive que les patientes ayant eu un "traitement conservateur".

Benoit André¹³³, dans sa thèse présentée en 2016 sur un échantillon de 47 patientes de notre série retrouvait une amélioration significative du questionnaire Medical Outcome Study Short Form - 36 (MOS SF – 36 : score générique pour l'évaluation de la qualité de vie) à 6 mois pour la douleur physique, la vitalité, la vie sociale, la qualité de vie physique et psychique. De même, Riiskjaer et al¹³⁴ ont montré une amélioration significative de la satisfaction sexuelle et une diminution des douleurs mictionnelles un an après une chirurgie de résection digestive pour endométriose sur une cohorte prospective de 128 patientes. Néanmoins la fréquence de la défécation était significativement augmentée 1 an après la chirurgie ($p=0,0001$) mais la fonction intestinale globale mesurée par le score LARS (Low Anterior Resection Score) était inchangée. De plus, les patientes qui avaient eu une fuite anastomotique avaient un risque significativement plus élevé d'incontinence urinaire à 1 an post-opératoire (Odds Ratio, OR=5,40 ; $p=0,002$). Dans cette série, 29 patientes (22,7%) ont eu une stomie de protection temporaire lorsque l'anastomose était située à moins de 6cm de la marge anale ou lorsque l'ouverture vaginale était large, les données concernant les complications post-opératoires n'étaient pas disponibles.

CONCLUSION

Notre étude a permis d'étudier les complications post-opératoires immédiates de la chirurgie de l'endométriose profonde. Il s'agit d'une chirurgie à haut risque de complications chez des patientes jeunes en bon état général, en activité sexuelle et avec un désir de fertilité. La morbidité post-opératoire est donc difficile à tolérer entraînant des conséquences physiques et psychologiques sévères. Il apparaît clairement dans notre série que le risque de complications post-opératoires en général et de fistule recto-vaginale en particulier augmentent de manière significative en cas d'ouverture vaginale et en cas de résection rectale segmentaire. Concernant l'intérêt de l'épiploplastie ou de la dérivation digestive de protection dans la prévention des complications en général et des fistules recto-vaginales en particulier, notre étude ne permet pas de conclure sur leur réalisation systématique probablement du fait du trop faible nombre (n=8) d'épiploplasties et de stomies de protection (n=19) réalisées dans notre série. Cependant, la réalisation de manière conjointe d'une stomie et d'une épiploplastie devrait être discutée chez les patientes à haut risque de complications (ouverture vaginale et RRS, résections digestives multiples).

En outre, l'intérêt de la réalisation d'une chirurgie en 2 temps avec un premier temps digestif et un second temps vaginal afin d'éviter une ouverture vaginale, à fort risque de complication dans ce contexte, devrait être soulevé.

Malgré les recommandations récentes de la HAS, des référentiels plus précis en termes de technique chirurgicale à employer en fonction du type d'atteinte, basés sur des études prospectives, permettraient probablement de diminuer les complications post-opératoires de ces chirurgies et harmoniseraient les pratiques à l'échelle nationale.

Vu, le président du jury
3/9/18

Didier Olivier FARANT
Professeur Hospitalier
Consultations Périnatales
Tél: 05 67 77 11 09
CHU Toulouse - Hôpital Pauline de Vignerot
Tél: 70004 - 31000 TOULOUSE cedex 9

Vu permis à exprimer
Le Doyen de la Faculté
de Médecine Toulouse - Purpan

Didier CARRIÉ

BIBLIOGRAPHIE

1. Zondervan, K. T. *et al.* Endometriosis. *Nat. Rev. Dis. Primer* **4**, (2018).
2. Borghese, B., Santulli, P., Marcellin, L. & Chapron, C. Définition, description, formes anatomo-cliniques, pathogenèse et histoire naturelle de l'endométriose, RPC Endométriose CNGOF-HAS. *Gynécologie Obstétrique Fertil. Sénologie* **46**, 156–167 (2018).
3. Vercellini, P., Viganò, P., Somigliana, E. & Fedele, L. Endometriosis: pathogenesis and treatment. *Nat. Rev. Endocrinol.* **10**, 261–275 (2014).
4. Fritel. Recommandations pour la pratique clinique. l'endométriose. *J. Gynécologie Obstétrique Biol. Reprod.* **36**, 105 (2007).
5. Knapp, V. J. How old is endometriosis? Late 17th- and 18th-century European descriptions of the disease. *Fertil. Steril.* **72**, 10–14 (1999).
6. Tailford, R. Dissertatio medica inauguralis de ulcerae uteri. *Leuven Theodorum*, 7–14 (1765).
7. Hoctin, P. Dissertatio medica inauguralis de inflammatione uteri. *Louvain Coster*, 1–16 (1779).
8. Benagiano, G., Brosens, I. & Lippi, D. The History of Endometriosis. *Gynecol. Obstet. Invest.* **78**, 1–9 (2014).
9. Rokitansky, C. A Manual of Pathological Anatomy (transl by W.E. Swaine). *Philadelphina Blanchard Lea vol I : General pathological anatomy*, 189–190 (1855).
10. Frankl, O. Adenomyosis uteri. *Am. J. Obstet. Gynecol.* **10**, 680–684 (1925).
11. Cullen, T. Adenomyoma of the round ligament. *Johns Hopkins Hosp Bull* 112–113 (1896).
12. Sampson, J. A. Peritoneal endometriosis due to the menstrual dissemination of endometrial tissue into the peritoneal cavity. *Am. J. Obstet. Gynecol.* **14**, 422–469 (1927).
13. Han, S. J. *et al.* The Dual Estrogen Receptor α Inhibitory Effects of the Tissue-Selective Estrogen Complex for Endometrial and Breast Safety. *Mol. Pharmacol.* **89**, 14–26 (2016).
14. Halme, J., Hammond, M. G., Hulka, J. F., Raj, S. G. & Talbert, L. M. Retrograde menstruation in healthy women and in patients with endometriosis. *Obstet. Gynecol.* **64**, 151–154 (1984).
15. Burney, R. O. & Giudice, L. C. Pathogenesis and pathophysiology of endometriosis. *Fertil. Steril.* **98**, 511–519 (2012).
16. Jenkins, S., Olive, D. L. & Haney, A. F. Endometriosis: pathogenetic implications of the anatomic distribution. *Obstet. Gynecol.* **67**, 335–338 (1986).
17. Jones, R. K., Searle, R. F. & Bulmer, J. N. Apoptosis and bcl-2 expression in normal human endometrium, endometriosis and adenomyosis. *Hum. Reprod. Oxf. Engl.* **13**, 3496–3502 (1998).
18. Canis, M. *et al.* Péritoine.
19. Chen, G. T. C., Tai, C.-T., Yeh, L.-S., Yang, T.-C. & Tsai, H.-D. Identification of the cadherin subtypes present in the human peritoneum and endometriotic lesions: Potential role for P-cadherin in the development of endometriosis. *Mol. Reprod. Dev.* **62**, 289–294 (2002).
20. Witz, C. A., Takahashi, A., Montoya-Rodriguez, I. A., Sook Cho, B. . & Schenken, R. S. Expression of the a2b1 and a3b1 integrins at the surface of mesothelial cells: a potential attachment site of endometrial cells.pdf.
21. Kyama, C. M. *et al.* Endometrial and peritoneal expression of aromatase, cytokines, and adhesion factors in women with endometriosis. *Fertil. Steril.* **89**, 301–310 (2008).

22. Bruner-Tran, K. L. *et al.* Steroid and Cytokine Regulation of Matrix Metalloproteinase Expression in Endometriosis and the Establishment of Experimental Endometriosis in Nude Mice. *J. Clin. Endocrinol. Metab.* **87**, 4782–4791 (2002).
23. Burns, K. A. *et al.* Early Endometriosis in Females Is Directed by Immune-Mediated Estrogen Receptor α and IL-6 Cross-Talk. *Endocrinology* **159**, 103–118 (2018).
24. Giudice, L. C. & Kao, L. C. Endometriosis. *Lancet Lond. Engl.* **364**, 1789–1799 (2004).
25. Russell, W. W. Aberrant portions of the müllerian duct found in an ovary. *Am. J. Obstet. Gynecol.* **134**, 225–226 (1899).
26. Von Recklinghausen, F. Adenomyomas and cystadenomas of the wall of the uterus and tube: their origin as remnants of the wolffian body. *Wien Klin Wochenschr* 8:530 (1896).
27. Sampson, J. A. Metastatic or Embolic Endometriosis, due to the Menstrual Dissemination of Endometrial Tissue into the Venous Circulation. *Am. J. Pathol.* **3**, 93–110.43 (1927).
28. Sasson, I. E. & Taylor, H. S. Stem cells and the pathogenesis of endometriosis. *Ann. N. Y. Acad. Sci.* **1127**, 106–115 (2008).
29. Hufnagel, D., Li, F., Cosar, E., Krikun, G. & Taylor, H. S. The Role of Stem Cells in the Etiology and Pathophysiology of Endometriosis. *Semin. Reprod. Med.* **33**, 333–340 (2015).
30. Suginami, H. A reappraisal of the coelomic metaplasia theory by reviewing endometriosis occurring in unusual sites and instances. *Am. J. Obstet. Gynecol.* **165**, 214–218 (1991).
31. Rosenfeld, D. L. & Lecher, B. D. Endometriosis in a patient with Rokitansky-Kuster-Hauser syndrome. *Am. J. Obstet. Gynecol.* **139**, 105 (1981).
32. Troncon, J. K. *et al.* Endometriosis in a patient with mayer-rokitansky-küster-hauser syndrome. *Case Rep. Obstet. Gynecol.* **2014**, 376231 (2014).
33. Mok-Lin, E. Y., Wolfberg, A., Hollinquist, H. & Laufer, M. R. Endometriosis in a patient with Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser syndrome and complete uterine agenesis: evidence to support the theory of coelomic metaplasia. *J. Pediatr. Adolesc. Gynecol.* **23**, e35-37 (2010).
34. Haas, D. *et al.* Endometriosis: a premenopausal disease? Age pattern in 42,079 patients with endometriosis. *Arch. Gynecol. Obstet.* **286**, 667–670 (2012).
35. Viganò, P., Parazzini, F., Somigliana, E. & Vercellini, P. Endometriosis: epidemiology and aetiological factors. *Best Pract. Res. Clin. Obstet. Gynaecol.* **18**, 177–200 (2004).
36. Nnoaham, K. E. *et al.* Impact of endometriosis on quality of life and work productivity: a multicenter study across ten countries. *Fertil. Steril.* **96**, 366-373.e8 (2011).
37. Eskenazi, B. & Warner, M. L. EPIDEMIOLOGY OF ENDOMETRIOSIS. 24
38. Redwine, D. B. Ovarian endometriosis: a marker for more extensive pelvic and intestinal disease. *Fertil. Steril.* **72**, 310–315 (1999).
39. Missmer, S. A. Incidence of Laparoscopically Confirmed Endometriosis by Demographic, Anthropometric, and Lifestyle Factors. *Am. J. Epidemiol.* **160**, 784–796 (2004).
40. Howard, F. M. The role of laparoscopy in chronic pelvic pain: promise and pitfalls. *Obstet. Gynecol. Surv.* **48**, 357–387 (1993).
41. Fauconnier, A., Fritel, X. & Chapron, C. [Endometriosis and pelvic pain: epidemiological evidence of the relationship and implications]. *Gynecol. Obstet. Fertil.* **37**, 57–69 (2009).
42. Fauconnier, A. *et al.* Comparison of patient- and physician-based descriptions of symptoms of endometriosis: a qualitative study. *Hum. Reprod. Oxf. Engl.* **28**, 2686–2694

- (2013).
43. Maroun, P., Cooper, M. J. W., Reid, G. D. & Keirse, M. J. N. C. Relevance of gastrointestinal symptoms in endometriosis. *Aust. N. Z. J. Obstet. Gynaecol.* **49**, 411–414 (2009).
 44. Seaman, H. E., Ballard, K. D., Wright, J. T. & de Vries, C. S. Endometriosis and its coexistence with irritable bowel syndrome and pelvic inflammatory disease: findings from a national case-control study--Part 2. *BJOG Int. J. Obstet. Gynaecol.* **115**, 1392–1396 (2008).
 45. Haute Autorité de santé - Prise en charge de l'endométriose Méthode Recommandations pour la pratique clinique. https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_2819733/fr/prise-en-charge-de-l-endometriose, 39 (2017).
 46. Bazot, M. *et al.* European society of urogenital radiology (ESUR) guidelines: MR imaging of pelvic endometriosis. *Eur. Radiol.* **27**, 2765–2775 (2017).
 47. Bazot, M. *et al.* Deep pelvic endometriosis: MR imaging for diagnosis and prediction of extension of disease. *Radiology* **232**, 379–389 (2004).
 48. Fiaschetti, V. *et al.* Deeply infiltrating endometriosis: evaluation of retro-cervical space on MRI after vaginal opacification. *Eur. J. Radiol.* **81**, 3638–3645 (2012).
 49. Nisenblat, V., Bossuyt, P. M. M., Farquhar, C., Johnson, N. & Hull, M. L. Imaging modalities for the non-invasive diagnosis of endometriosis. *Cochrane Database Syst. Rev.* **2**, CD009591 (2016).
 50. Abrao, M. S. *et al.* Comparison between clinical examination, transvaginal sonography and magnetic resonance imaging for the diagnosis of deep endometriosis. *Hum. Reprod. Oxf. Engl.* **22**, 3092–3097 (2007).
 51. Scardapane, A. *et al.* Diagnosis of colorectal endometriosis: contribution of contrast enhanced MR-colonography. *Eur. Radiol.* **21**, 1553–1563 (2011).
 52. Kikuchi, I. *et al.* Diagnosis of complete cul-de-sac obliteration (CCDSO) by the MRI jelly method. *J. Magn. Reson. Imaging JMRI* **29**, 365–370 (2009).
 53. Rossi, L. *et al.* Can rectal endoscopic sonography be used to predict infiltration depth in patients with deep infiltrating endometriosis of the rectum? *Ultrasound Obstet. Gynecol. Off. J. Int. Soc. Ultrasound Obstet. Gynecol.* **43**, 322–327 (2014).
 54. Bazot, M. *et al.* Accuracy of magnetic resonance imaging and rectal endoscopic sonography for the prediction of location of deep pelvic endometriosis. *Hum. Reprod. Oxf. Engl.* **22**, 1457–1463 (2007).
 55. Chapron, C. *et al.* Accuracy of rectal endoscopic ultrasonography and magnetic resonance imaging in the diagnosis of rectal involvement for patients presenting with deeply infiltrating endometriosis. *Ultrasound Obstet. Gynecol. Off. J. Int. Soc. Ultrasound Obstet. Gynecol.* **24**, 175–179 (2004).
 56. Vassilieff, M. *et al.* Coloscanner à l'air avec coloscopie virtuelle : arguments dans le choix du traitement chirurgical des endométrioses colorectales. *Gynécologie Obstétrique Fertil.* **39**, 339–345 (2011).
 57. Jeong, S.-Y. *et al.* The Usefulness of Computed Tomographic Colonography for Evaluation of Deep Infiltrating Endometriosis: Comparison With Magnetic Resonance Imaging. *J. Comput. Assist. Tomogr.* **37**, 809–814 (2013).
 58. Mehedințu, C. *et al.* Does Computed Tomography–Based Virtual Colonoscopy Improve the Accuracy of Preoperative Assessment Based on Magnetic Resonance Imaging in Women Managed for Colorectal Endometriosis? *J. Minim. Invasive Gynecol.* (2018). doi:10.1016/j.jmig.2018.01.019
 59. Wang, W. *et al.* Endometriosis fertility index score maybe more accurate for predicting the outcomes of in vitro fertilisation than r-AFS classification in women with endometriosis. *Reprod. Biol. Endocrinol.* **11**, 112 (2013).
 60. Chapron, C. Anatomical distribution of deeply infiltrating endometriosis: surgical

- implications and proposition for a classification. (2003).
61. Nnoaham, K. E., Webster, P., Kumbang, J., Kennedy, S. H. & Zondervan, K. T. Is early age at menarche a risk factor for endometriosis? A systematic review and meta-analysis of case-control studies. *Fertil. Steril.* **98**, 702-712.e6 (2012).
 62. Missmer, S. A. *et al.* Reproductive history and endometriosis among premenopausal women. *Obstet. Gynecol.* **104**, 965–974 (2004).
 63. Peterson, C. M. *et al.* Risk factors associated with endometriosis: importance of study population for characterizing disease in the ENDO Study. *Am. J. Obstet. Gynecol.* **208**, 451.e1-451.e11 (2013).
 64. Farland, L. V. *et al.* History of breast feeding and risk of incident endometriosis: prospective cohort study. *BMJ* j3778 (2017). doi:10.1136/bmj.j3778
 65. Parazzini, F. *et al.* Risk factors for deep endometriosis: a comparison with pelvic and ovarian endometriosis. *Fertil. Steril.* **90**, 174–179 (2008).
 66. Signorello, L. B., Harlow, B. L., Cramer, D. W., Spiegelman, D. & Hill, J. A. Epidemiologic determinants of endometriosis: A hospital-based case-control study. *Ann. Epidemiol.* **7**, 267–274 (1997).
 67. Nagle, C. M. *et al.* Relative weight at ages 10 and 16 years and risk of endometriosis: a case-control analysis. *Hum. Reprod.* **24**, 1501–1506 (2009).
 68. Schrodt, G. R., Alcorn, M. O. & Ibanez, J. Endometriosis of the male urinary system: a case report. *J. Urol.* **124**, 722–723 (1980).
 69. González, R. S., Vnencak-Jones, C. L., Shi, C. & Fadare, O. Endomyometriosis ('Uterus-like mass') in an XY Male: Case Report With Molecular Confirmation and Literature Review. *Int. J. Surg. Pathol.* **22**, 421–426 (2014).
 70. Cramer, D. W. *et al.* The relation of endometriosis to menstrual characteristics, smoking, and exercise.
 71. Dumont, A. *et al.* Physiopathologie de l'endométriose. 13 (2017).
 72. Moen, M. H. & Magnus, P. The familial risk of endometriosis. *Acta Obstet. Gynecol. Scand.* **72**, 560–564 (1993).
 73. Simpson, J. L., Elias, S., Malinak, L. R. & Buttram, V. C. Heritable aspects of endometriosis: I. Genetic studies. *Am. J. Obstet. Gynecol.* **137**, 327–331 (1980).
 74. Vannuccini, S. *et al.* Potential influence of in utero and early neonatal exposures on the later development of endometriosis. *Fertil. Steril.* **105**, 997–1002 (2016).
 75. Borghese, B., Vaiman, D., de Ziegler, D. & Chapron, C. Endométriose et génétique : les gènes sont-ils responsables de la maladie ? *J. Gynécologie Obstétrique Biol. Reprod.* **39**, 196–207 (2010).
 76. Stern, R. Malignancy in Endometriosis: Frequency and Comparison of Ovarian and Extraovarian Types. (2001).
 77. Pearce, C. L. *et al.* Association between endometriosis and risk of histological subtypes of ovarian cancer: a pooled analysis of case-control studies. *Lancet Oncol.* **13**, 385–394 (2012).
 78. Farland, L. V. *et al.* Endometriosis and the risk of skin cancer: a prospective cohort study. *Cancer Causes Control* **28**, 1011–1019 (2017).
 79. Guo, S.-W. Recurrence of endometriosis and its control. *Hum. Reprod. Update* **15**, 441–461 (2009).
 80. Weir, E., Mustard, C., Cohen, M. & Kung, R. Endometriosis: what is the risk of hospital admission, readmission, and major surgical intervention? *J. Minim. Invasive Gynecol.* **12**, 486–493 (2005).
 81. Vignali, M. *et al.* Surgical treatment of deep endometriosis and risk of recurrence. *J. Minim. Invasive Gynecol.* **12**, 508–513 (2005).
 82. Fedele, L. *et al.* Laparoscopic excision of recurrent endometriomas: long-term outcome and comparison with primary surgery. *Fertil. Steril.* **85**, 694–699 (2006).

83. Brown, J., Pan, A. & Hart, R. Gonadotrophin-Releasing Hormone Analogues for Pain Associated With Endometriosis: *Obstet. Gynecol.* **117**, 727–728 (2011).
84. Taylor, H. S. *et al.* Treatment of Endometriosis-Associated Pain with Elagolix, an Oral GnRH Antagonist. *N. Engl. J. Med.* **377**, 28–40 (2017).
85. Jacobson, T. Z., Duffy, J. M. N., Barlow, D., Koninckx, P. R. & Garry, R. Laparoscopic surgery for pelvic pain associated with endometriosis. *Cochrane Database Syst. Rev.* CD001300 (2009). doi:10.1002/14651858.CD001300.pub2
86. Sutton, C. J., Ewen, S. P., Whitelaw, N. & Haines, P. Prospective, randomized, double-blind, controlled trial of laser laparoscopy in the treatment of pelvic pain associated with minimal, mild, and moderate endometriosis. *Fertil. Steril.* **62**, 696–700 (1994).
87. Marcoux, S., Maheux, R. & Bérubé, S. Laparoscopic surgery in infertile women with minimal or mild endometriosis. Canadian Collaborative Group on Endometriosis. *N. Engl. J. Med.* **337**, 217–222 (1997).
88. Jacobson, T. Z. *et al.* Laparoscopic surgery for subfertility associated with endometriosis. *Cochrane Database Syst. Rev.* CD001398 (2010). doi:10.1002/14651858.CD001398.pub2
89. Dunselman, G. a. J. *et al.* ESHRE guideline: management of women with endometriosis. *Hum. Reprod. Oxf. Engl.* **29**, 400–412 (2014).
90. Ahmad, G., O’Flynn, H., Hindocha, A. & Watson, A. Barrier agents for adhesion prevention after gynaecological surgery. *Cochrane Database Syst. Rev.* CD000475 (2015). doi:10.1002/14651858.CD000475.pub3
91. Asgari, Z. *et al.* Comparing ovarian reserve after laparoscopic excision of endometriotic cysts and hemostasis achieved either by bipolar coagulation or suturing: a randomized clinical trial. *Arch. Gynecol. Obstet.* **293**, 1015–1022 (2016).
92. Ding, W., Li, M. & Teng, Y. The impact on ovarian reserve of haemostasis by bipolar coagulation versus suture following surgical stripping of ovarian endometrioma: a meta-analysis. *Reprod. Biomed. Online* **30**, 635–642 (2015).
93. Roman, H. A national snapshot of the surgical management of deep infiltrating endometriosis of the rectum and colon in France in 2015: A multicenter series of 1135 cases. *J. Gynecol. Obstet. Hum. Reprod.* **46**, 159–165 (2017).
94. Darai, E. *et al.* Feasibility and clinical outcome of laparoscopic colorectal resection for endometriosis. *Am. J. Obstet. Gynecol.* **192**, 394–400 (2005).
95. Chantalat, E. *et al.* Consequences of delayed diagnosis of acute gastrointestinal intussusception, secondary to endometriosis. *J. Obstet. Gynaecol. Res.* **43**, 595–598 (2017).
96. Jayot, A., Nyangoh Timoh, K., Bendifallah, S., Ballester, M. & Darai, E. Comparison of Laparoscopic Discoid Resection and Segmental Resection for Colorectal Endometriosis Using a Propensity Score Matching Analysis. *J. Minim. Invasive Gynecol.* **25**, 440–446 (2018).
97. Fanfani, F. *et al.* Discoid or segmental rectosigmoid resection for deep infiltrating endometriosis: a case-control study. *Fertil. Steril.* **94**, 444–449 (2010).
98. Darai, E., Cohen, J. & Ballester, M. Colorectal endometriosis and fertility. *Eur. J. Obstet. Gynecol. Reprod. Biol.* **209**, 86–94 (2017).
99. Kent, A. *et al.* Laparoscopic Surgery for Severe Rectovaginal Endometriosis Compromising the Bowel: A Prospective Cohort Study. *J. Minim. Invasive Gynecol.* **23**, 526–534 (2016).
100. Roman, H. *et al.* Long-term functional outcomes following colorectal resection versus shaving for rectal endometriosis. *Am. J. Obstet. Gynecol.* **215**, 762.e1-762.e9 (2016).
101. Dindo, D., Demartines, N. & Clavien, P.-A. Classification of Surgical Complications: A New Proposal With Evaluation in a Cohort of 6336 Patients and Results of a Survey. *Ann. Surg.* **240**, 205–213 (2004).

102. Oliveira, M. A. P. *et al.* Bowel complications in endometriosis surgery. *Best Pract. Res. Clin. Obstet. Gynaecol.* **35**, 51–62 (2016).
103. Telem, D. A., Chin, E. H., Nguyen, S. Q. & Divino, C. M. Risk factors for anastomotic leak following colorectal surgery: a case-control study. *Arch. Surg. Chic. Ill 1960* **145**, 371–376; discussion 376 (2010).
104. Frasson, M. *et al.* Risk Factors for Anastomotic Leak After Colon Resection for Cancer: Multivariate Analysis and Nomogram From a Multicentric, Prospective, National Study With 3193 Patients. *Ann. Surg.* **262**, 321–330 (2015).
105. Tan, W. P., Talbott, V. A., Leong, Q. Q., Isenberg, G. A. & Goldstein, S. D. American Society of Anesthesiologists class and Charlson’s comorbidity index as predictors of postoperative colorectal anastomotic leak: a single-institution experience. *J. Surg. Res.* **184**, 115–119 (2013).
106. Ruffo, G. *et al.* Laparoscopic colorectal resection for deep infiltrating endometriosis: analysis of 436 cases. *Surg. Endosc.* **24**, 63–67 (2010).
107. Dousset, B. *et al.* Complete surgery for low rectal endometriosis: long-term results of a 100-case prospective study. *Ann. Surg.* **251**, 887–895 (2010).
108. Abrão, M. S. *et al.* Deep endometriosis infiltrating the recto-sigmoid: critical factors to consider before management. *Hum. Reprod. Update* **21**, 329–339 (2015).
109. Roman, H. *et al.* Full-Thickness Disc Excision in Deep Endometriotic Nodules of the Rectum: A Prospective Cohort. *Dis. Colon Rectum* **58**, 957–966 (2015).
110. De Cicco, C. *et al.* Bowel resection for deep endometriosis: a systematic review: Systematic review of bowel resection for deep endometriosis. *BJOG Int. J. Obstet. Gynaecol.* **118**, 285–291 (2011).
111. Darai, E., Dubernard, G., Azoulay, C. & Barranger, E. Indications des analogues de la GnRH en pré- et postchirurgie pour endométriase. 4 (2005).
112. Audebert, A. *et al.* Pre or post-operative medical treatment with nafarelin in stage III–IV endometriosis: a French multicenter study. *Eur. J. Obstet. Gynecol. Reprod. Biol.* **79**, 145–148 (1998).
113. Muzii, L., Marana, R., Caruana, P. & Mancuso, S. The impact of preoperative gonadotropin-releasing hormone agonist treatment on laparoscopic excision of ovarian endometriotic cysts. *Fertil. Steril.* **65**, 1235–1237 (1996).
114. Belghiti, J. *et al.* Role of protective defunctioning stoma in colorectal resection for endometriosis. *J. Minim. Invasive Gynecol.* **21**, 472–479 (2014).
115. Tsutsumi, N., Yoshida, Y., Maehara, Y. & Kohnoe, S. Rectovaginal fistula following double-stapling anastomosis in low anterior resection for rectal cancer. *Hepatogastroenterology.* **54**, 1682–1683 (2007).
116. Emoto, S. *et al.* Rectovaginal fistula after low anterior resection for rectal cancer healed by nonoperative treatment. *Int. J. Surg. Case Rep.* **41**, 121–123 (2017).
117. Ellis, C. N. Outcomes after repair of rectovaginal fistulas using bioprosthetics. *Dis. Colon Rectum* **51**, 1084–1088 (2008).
118. Ellis, C. N. Bioprosthetic Plugs for Complex Anal Fistulas: An Early Experience. *J. Surg. Educ.* **64**, 36–40 (2007).
119. Cintron, J. R. *et al.* Treatment of fistula-in-ano using a porcine small intestinal submucosa anal fistula plug. *Tech. Coloproctology* **17**, 187–191 (2013).
120. Akladios, C. *et al.* Is Ileostomy Always Necessary Following Rectal Resection for Deep Infiltrating Endometriosis? *J. Minim. Invasive Gynecol.* **22**, 103–109 (2015).
121. Montedori, A., Abraha, I., Cirocchi, R. & Sciannameo, F. Covering ileo- or colostomy in anterior resection for rectal carcinoma. in *Cochrane Database of Systematic Reviews* (ed. The Cochrane Collaboration) (John Wiley & Sons, Ltd, 2008). doi:10.1002/14651858.CD006878
122. Ledu, N., Rubod, C., Piessen, G., Roman, H. & Collinet, P. Management of deep

- infiltrating endometriosis of the rectum: Is a systematic temporary stoma relevant? *J. Gynecol. Obstet. Hum. Reprod.* **47**, 1–7 (2018).
123. Chen, J. *et al.* Meta-analysis of temporary ileostomy versus colostomy for colorectal anastomoses. *Acta Chir. Belg.* **113**, 330–339 (2013).
124. Güenaga, K. F., Lustosa, S. a. S., Saad, S. S., Saconato, H. & Matos, D. Ileostomy or colostomy for temporary decompression of colorectal anastomosis. *Cochrane Database Syst. Rev.* CD004647 (2007). doi:10.1002/14651858.CD004647.pub2
125. Knabben, L. *et al.* Urinary tract endometriosis in patients with deep infiltrating endometriosis: prevalence, symptoms, management, and proposal for a new clinical classification. *Fertil. Steril.* **103**, 147–152 (2015).
126. Saavalainen, L., Heikinheimo, O., Tiitinen, A. & Härkki, P. Deep infiltrating endometriosis affecting the urinary tract-surgical treatment and fertility outcomes in 2004-2013. *Gynecol. Surg.* **13**, 435–444 (2016).
127. Neutzling, C. B., Lustosa, S. A. S., Proenca, I. M., da Silva, E. M. K. & Matos, D. Stapled versus handsewn methods for colorectal anastomosis surgery. *Cochrane Database Syst. Rev.* CD003144 (2012). doi:10.1002/14651858.CD003144.pub2
128. Güenaga, K. F., Matos, D. & Wille-Jørgensen, P. Mechanical bowel preparation for elective colorectal surgery. *Cochrane Database Syst. Rev.* (2011). doi:10.1002/14651858.CD001544.pub4
129. Platell, C., Barwood, N. & Makin, G. Randomized clinical trial of bowel preparation with a single phosphate enema or polyethylene glycol before elective colorectal surgery. *Br. J. Surg.* **93**, 427–433 (2006).
130. Nelson, R. L., Gladman, E. & Barbateskovic, M. Antimicrobial prophylaxis for colorectal surgery. *Cochrane Database Syst. Rev.* CD001181 (2014). doi:10.1002/14651858.CD001181.pub4
131. Wiggins, T., Markar, S. R., Arya, S. & Hanna, G. B. Anastomotic reinforcement with omentoplasty following gastrointestinal anastomosis: A systematic review and meta-analysis. *Surg. Oncol.* **24**, 181–186 (2015).
132. Ricciardi, R. *et al.* Anastomotic leak testing after colorectal resection: what are the data? *Arch. Surg. Chic. Ill 1960* **144**, 407–411; discussion 411-412 (2009).
133. André, B. Chirurgie cœlioscopique robot-assistée de l'endométriase pelvienne profonde avec atteinte du compartiment postérieur : impact sur la qualité de vie, la sexualité et la symptomatologie des patientes. (2016).
134. Riiskjaer, M. *et al.* Pelvic organ function before and after laparoscopic bowel resection for rectosigmoid endometriosis: a prospective, observational study. *BJOG Int. J. Obstet. Gynaecol.* **123**, 1360–1367 (2016).

IMMEDIATE POSTOPERATIVE COMPLICATIONS OF DEEP BOWEL ENDOMETRIOSIS SURGERY : DESCRIPTIVE STUDY ON 164 PATIENTS.

ABSTRACT :

Introduction : The objective of this study was to compare the immediate postoperative complications of surgical treatments of deep pelvic endometriosis according to the surgical technique employed.

Materials and methods : We included patients operated for deep bowel endometriosis between December 2012 and January 2018. The choice of the surgical technique (shaving, disc resection DR, segmental rectal resection SRR or multiple surgery) depended on the surgeon according to the pre-operative data. Early postoperative complications were studied up to 30 days after the intervention date.

Results : This is an observational, descriptive, retrospective study. 164 patients were included between 2012 and 2018. The average age of the patients was 34.4 years (+/- 4,9 years), 32.8% of the patients were smokers, the average BMI was 21.7. Endometriotic nodules averaged 28.1mm [+/- 16.9mm], averaging 11.8cm [+/- 5.4] of the anal verge. Robot-assisted laparoscopy was performed in 122 patients (74.4%), "simple" laparoscopy in 36 patients (21,9%) and laparotomy in 6 patients (3,7%), laparoconversion was required for 1 patient. 52.4% (n=86) of patients underwent shaving, 17.1% (n=30) of DR, 33.5% (n=59) of SSR and 9.8% (n=16) of resection of multiple nodules. Any complication occurred in 37.8% (n=62) of the cases with surgical revision required in 18.3% (n=30) of the cases. A transfusion was necessary for 1 patient, and 15 patients (9.1%) presented with bladder atony. A recto-vaginal fistula was present postoperatively in 16 patients (9.8% of cases) and vesico-vaginal fistula in 3 patients (1.8%). In multivariate analysis, the OR for rectovaginal fistula is 22.71 if surgery is a SRR (IC95% [2.74–188.01];p=0,005) and 19.67 (IC95% [2,43-159,18];p=0,005) if there was a vaginal opening.

Conclusion : Our data allow us to conclude that vaginal opening and segmental rectal resection are major risk factors for rectovaginal fistula. A two-stage surgical treatment associated with a protective stoma of patients with digestive and vaginal invasion by an endometriosis nodule could prevent the risk of rectovaginal fistula.

TITRE EN ANGLAIS : Immediate postoperative complications of deep bowel endometriosis surgery : descriptive study on 164 patients.

DISCIPLINE ADMINISTRATIVE : Médecine spécialisée clinique

KEY-WORDS : deep bowel endometriosis, immediate postoperative complications, recto-vaginal fistula, segmental rectal resection, shaving, disc resection

INTITULÉ ET ADRESSE DE L'UFR OU DU LABORATOIRE :

Université Toulouse III-Paul Sabatier
Faculté de médecine Toulouse-Purpan,
37 Allées Jules Guesde 31000 Toulouse

Directeur de thèse : Elodie CHANTALAT

RESUME EN FRANCAIS

GORNES Hugo

2018 TOU3 1577

COMPLICATIONS POST-OPERATOIRES IMMEDIATES DE LA CHIRURGIE DE L'ENDOMETRIOSE PELVIENNE PROFONDE AVEC ATTEINTE DIGESTIVE : ETUDE DESCRIPTIVE SUR 164 PATIENTES

RESUME EN FRANÇAIS :

Introduction : L'objectif de cette étude était de comparer les complications post-opératoires immédiates des traitements chirurgicaux de l'endométriose pelvienne profonde avec atteinte digestive en fonction de la technique chirurgicale employée.

Matériels et méthodes : Nous avons inclus les patientes opérées pour une endométriose pelvienne profonde avec atteinte digestive entre Décembre 2012 et Janvier 2018. Le choix de la technique chirurgicale (shaving, résection discoïde RD, résection rectale segmentaire RRS ou d'une chirurgie multiple CM) dépendait du chirurgien en fonction du bilan pré-opératoire. Les complications post-opératoires précoces ont été étudiées jusqu'à 30 jours après la date de l'intervention.

Résultats : Il s'agit d'une étude observationnelle, descriptive, rétrospective. 164 patientes ont été incluses entre 2012 et 2018. L'âge moyen des patientes était de 34,4 ans (+/-4,9 ans), 32,8% des patientes étaient tabagiques, l'IMC moyen était de 21,7. Les nodules endométriosiques mesuraient en moyenne 28,1mm [+/-16,9mm], ils étaient situés en moyenne à 11,8cm [+/-5,4cm] de la marge anale. Une coelioscopie robot-assistée était réalisée chez 122 patientes (74,4%), une coelioscopie "simple" chez 36 patientes (21,9%) et une laparotomie chez 6 patientes (3,7%), une laparoconversion a été nécessaire chez 1 patiente. 52,4% (n=86) des patientes ont bénéficié d'un shaving, 9,1% (n=15) d'une résection discoïde, 28,7% (n=47) d'une RRS et 9,8% (n=16) de CM. Une complication, quelle qu'elle soit, survenait dans 37,8% (n=62) des cas avec nécessité d'une reprise chirurgicale dans 18,3% (n=30) des cas. Une transfusion a été nécessaire pour une patiente, 15 patientes (9,1%) ont présenté une atonie vésicale. On retrouvait une fistule recto-vaginale post-opératoire chez 16 patientes (9,8% des cas) et une fistule vésico-vaginale chez 3 patientes (1,8%). En analyse multivariée, l'OR pour la fistule recto-vaginale est de 22,71 si la chirurgie était une RRS (IC95% [2,74–188,01];p=0,005) et de 19,67 (IC95% [2,43-159,18];p=0,005) s'il y avait une ouverture vaginale.

Conclusion : Nos données nous permettent de conclure que l'ouverture vaginale et la résection rectale segmentaire sont des facteurs de risque majeurs de fistule recto-vaginale. Une prise en charge chirurgicale en 2 temps associée à une dérivation digestive de protection des patientes présentant un envahissement digestif et vaginal par un nodule d'endométriose pourrait prévenir le risque de fistule recto-vaginale.

TITRE EN ANGLAIS : Immediate postoperative complications of deep bowel endometriosis surgery : descriptive study on 164 patients.

DISCIPLINE ADMINISTRATIVE : Médecine spécialisée clinique

MOTS-CLÉS : endométriose pelvienne profonde, complications post-opératoires, fistule recto-vaginale, résection rectale segmentaire, shaving, résection discoïde

INTITULÉ ET ADRESSE DE L'UFR OU DU LABORATOIRE :

Université Toulouse III-Paul Sabatier
Faculté de médecine Toulouse-Purpan,
37 Allées Jules Guesde 31000 Toulouse

Directeur de thèse : Elodie CHANTALAT